

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百十三

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣金光悌

謄錄監生臣王頌修

欽定四庫全書卷

普濟方卷三百十二

明

周王朱橚撰

折傷門

從高墜下

附論

黃帝曰中風有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下積於脇則傷肝又中風及有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾又頭痛不可取於脰者有所擊墮惡血在內傷痛未已可則刺不可遠取之也夫從高墜下

惡血留於內不分十二經絡聖人俱作風中肝經留於
脇下以中風療之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不
問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有
自汗但人有汗出皆為風證諸痛皆屬於肝況敗血凝
結從其所屬入於肝也從高墜下逆其上之血氣非肝
而何非傷寒無汗既自汗必是風化也以破血出經藥
治之夫肝膽之經俱行於脇下經屬於厥陰少陰宜以
柴胡為引用為君以當歸活血脈又急者痛也甘草緩

其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲枯萆根
桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以盪滌敗血為
之使氣味相合使血氣各有所歸痛自去矣

方

蒲黃散

出聖惠方

治從高墜下落馬墜車碾著腕損骨碎
筋傷內損惡血攻心悶絕坐臥不安宜先須按摩排

正筋骨宜服此藥止痛散血

蒲黃

兩

當歸

三

玄胡索

兩

芎藭

三

赤芍

藥兩

淹藺子分三

沒藥兩

附子

一兩炮裂去皮臍

栗子

二兩去殼陰乾

川大黃

一兩剉碎微炒

芸臺子

一兩

右搗羅為散每服以溫酒調下二錢不拘時候頻服

沒藥散

出聖濟總錄

治墜墮損傷筋骨皮肉發熱疼痛

沒藥

研

澤瀉

焙切

桂

去粗皮

檳榔

甘草

炙剉

白芷

蜀椒

去目并閉口者炒出汗

附子

炮裂去皮臍

芎藭

各一兩

當歸

三分

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

鎮心散

出聖惠方

治因傷折後驚悸心神煩悶宜服定魂

魄

虎睛

一對用生羊血浸一宿漉出陰乾

金箔

銀箔

各五十片細研

茯神

遠志

心去人參

去蘆頭各半兩

麥門冬

去心焙

蒲黃

羚羊角屑

各一兩

硃砂

二兩細研水飛過

右為末用棗肉入煉蜜同和搗三百杵如梧桐子

大每服於食後并夜臥時以茯神湯下三十丸

續斷散

出聖濟總錄

治從高墜下傷損筋骨發熱腫痛

續斷剉

生乾地黄焙

當歸切焙

芍藥

附子

炮裂去
皮臍

桂去粗皮
各一兩

澤蘭葉

蜀椒

去目并閉
口者炒出

汗

甘草

炙剉各
半兩

右為散每服三錢溫酒調下不拘時候

破血散痛湯 治從高損傷墜馬惡血流於脇下痛甚

不能轉側妨其飲食

羌活

防風

中桂各一錢

柴胡

連翹各二錢

當歸稍錢二

麝香

少許
別研

蘇子

一錢半
一方無

水蛭炒去

烟盡
另研

右分為二服每服酒二大盞除水蛭麝香外另研如
泥煎餘藥依一大盞去滓上火令稍熟調二味飢服
之

乾地黃散 治從高墮下傷損疼痛

生乾地黃

兩一

當歸

微炒一兩剉

附子

去皮臍一兩炮裂

川大黃

兩半

續斷

兩半

桂心

兩一

琥珀

兩半

枳殼

半兩麩炒
微黃去穰

桃仁

一兩湯浸去皮
共雙仁微炒

右為細散溫酒調下一錢不拘時候

芎藭散 治從高墜下車馬諸傷腕折疼痛不可忍

芎藭

玄胡索

桂肉

去粗皮

桃仁

湯浸去皮尖雙仁微炒

附子

炮去皮臍各一兩

澤蘭

半兩

虎脰骨

二兩塗酥炙黃

右為細末溫酒調下二錢不拘時候

大膠艾湯 治男子傷絕或從高墜下傷五臟微者唾

血及金瘡傷經者

阿膠

艾葉

甘草

當歸

芎藭

各一兩

乾薑

一兩 乾地黄 芍藥 各三兩

右以水八升煮取三升去滓內膠令烊分服羸人分三服兼治婦人產後崩傷下血過多虛喘欲死腹中激痛下血不止

復元活血湯 治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍

柴胡 錢五 當歸 錢三 甘草 川山甲 炮 紅花

瓜蒌根 各二錢

大黃 酒浸 一兩

桃仁 去皮尖 五十粒

右桃仁研爛餘藥剉如豆大每服一兩水二盞半酒半盞煎至七分去渣溫服食前以利為度得利後痛或不盡服乳香神應散方見本類後黃帝鍼經云有所墮墜惡血流內若有所大怒氣上而不行下積於脇則傷肝肝膽之經俱行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血甘草生陽生陰長故也為臣山甲瓜蒌根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒

製以盪滌敗血為之使氣味和合氣血各有所歸痛

自然去矣

接骨丹 治從高墜墮傷損疼痛

當歸

切焙
二兩

甘草

剉炒
三兩

桂

去粗皮
一兩半

沒藥

另研

乳香

另研各
半兩

澤蘭

一兩

自然銅

火燒紅淬七
次一兩研

右為細末入研藥令勻水麪糊和丸如梧桐子大每服三十九丸溫酒調下不拘時候日進三服

牽牛子散

治從高墜下傷折有瘀血不散脅肋疼

痛

牽牛子

生取末

當歸

切焙各一兩

檳榔

剉

桂心

去粗

皮

木香

炮各半兩

郁李仁

湯浸去皮細研

青橘皮

湯浸去皮

白各一兩

右為散和勻每服一錢空心溫酒調下取瘀血為效
外以敗龜膏貼方見本類後

附子散

治從高墜下落馬車碾一切傷折理血止痛

附子

炮裂去皮臍

沒藥

蒲黃

當歸

芎藭薑

黃赤芍藥

已上各一兩

右為細散溫酒調下二錢不拘時候

接骨草散 治從高墜下損骨折筋傷肉

接骨草

巴戟

各二兩

紫葛根

剉

石斛

去根剉

丁香 續斷

阿魏

麝裏煨麝熟為度已上各一兩

右為細散溫酒調下二錢不拘時候

沒藥膏 治從高墜下傷損筋骨打破皮肉疼痛

沒藥

當歸

剉微炒

麒麟竭

蒲黃

牡丹皮

骨碎補

橘仁

微炒各一兩

右為細末以溫酒調下二錢不拘時候

葵根散

治從高墜墮損折車碾馬墜筋骨蹉跌甚者

大小腸不通皆被瘀血與衛氣不和致令不通

葵根

一兩

木通

蘧麥

川大黃

剉碎微炒各二兩

甘

草

炙赤剉半兩

鹿葱葉并根

一兩

右搗粗羅為散每服四錢以水一盞煎至六分去渣

不拘時候溫酒調下滑石末一錢

桃仁湯 治從高墮下落大木車馬間胷腹中有血不
得氣息者

桃仁四十枚

大棗二十枚

大黃

硝石

甘草各一

兩

蒲黃

一兩半

右呔咀以水三升煮取一升絞去渣適寒溫盡服之
當下下不止漬麻汁一杯飲之即止

乳香神應散 治從高墮下疼痛不可忍及腹中疼痛
者

乳香 沒藥 雄黑豆 桑白皮 獨科栗各一

兩 破故紙炒三兩

右為末每服五錢醋一盞砂石器內煎至六分入麝

香少許溫服

巴戟湯 治從高墜下及打撲內損昏冒嗜睡不能飲

食此謂血閉及臟腑不通

巴戟去心半兩 當歸 地黃 芍藥 川芎各一兩

大黃半兩

右為粗末水煎服以利為度

桃仁散 治從高墮下傷損腹中瘀血滯疼痛

桃仁

半兩湯浸去皮共生研細

當歸

一分搗末

牽牛子

半兩生搗

琥珀末

一分

膩粉

一分

右研令勻分為三服生地黃二兩生薑一兩切細炒令紫色入小便一小盞酒一大盞煎至一大盞去滓空心調下一服當取下惡血疼痛立定

芸臺散 治從高墮下墮損惡血在骨節間疼痛

荊芥

藕節

陰乾各二兩

淨芸臺子

馬齒莧

陰乾

川芒硝

各一兩

右為細末用蘇枋木半兩酒一大盞煎至七分調下

二錢不拘時候

敗龜膏 治從高墜下傷折有瘀血不散脇肋疼痛一名

靈龜膏

敗龜

酒浸炙二兩半

大黃

生剉一兩

木鼈子

去殼研二兩

當

歸

切焙一兩

桂

去粗皮二兩

右為末好酒一升煎至半升住火稍冷入藥末半兩以柳木梘不住手攪成膏以油單紙上攤貼傷損痛處立効

阿膠湯 治從高墮下傷五臟微者唾血甚者吐血及瘡經傷金崩中皆主之

阿膠 艾葉 乾薑

各二兩

為藥

三兩

右㕮咀以水八升煮取三升去滓內膠令稍冷分二服羸人分三服兼治女人產後崩傷下血過多虛喘

腹中絞痛下血不止者服之悉愈

蒲黃散 治因墜墮內損血結不行

蒲黃

當歸

焙切

赤芍藥

剉

桂

去粗皮各一兩

右為細末每用二錢溫酒調下不拘時候

接骨散 治從高墜下遂至傷折筋斷骨碎痛不可忍

接骨續筋止痛活血

方見本門接骨類一名神授散

奪命散 治金瘡打損及從高墜下木石所壓內損瘀

血心腹疼痛大小便不利氣絕欲死

大黃 黑牽牛皮各二兩

水蛭

石灰漫火炒令焦黃色半兩

右為末每服三錢熱酒調下如人行四五里再用熱酒調牽牛末二錢催之須臾轉下惡血成塊成片其惡血淨即愈

當歸湯

治從高墜墮傷損肢體發熱疼痛

當歸

切焙四兩

大黃

生剉二兩

生乾地黃

焙五兩

右粗搗篩每服五錢水一盞半煎至七分去滓溫服不拘時候立効

蘇合香丸

治從高墜下挾驚悸血氣錯亂昏迷不省

急服大効

方見諸氣門

沒藥散

治被重物壓碎傷筋骨疼痛血不散

沒藥

虎脰骨

塗酥炙黃

當歸

剉微炒

玄胡索

各二兩

補骨脂

白芷

生乾地黄

剉微炒

川大黃

剉微炒

蒲黃

微炒

獨頭栗子黃

乾者各一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

芸臺子散

治壓碎傷損筋骨或墜墮內損瘀血攻心

腹脹滿悶亂下惡血

芸臺子 沒藥 蒲黃 膩粉各一分 水蛭七枚 炒令

微黃 生薑汁合 酒合 生地黄汁合 川大黃

半兩 劉
碎微炒

右除汁藥外為細末研入膩粉令勻先將地黃生薑等汁及酒同煎三兩沸調藥散二錢空心服之當轉下惡血疼痛立止矣

桃仁散 治被壓 損瘀血在腹中疝痛不散心胃短

氣大小便不通

荊芥兩 大黃兩 蒲黃各二兩 芎藭 木通

當歸 桂各一兩 桃仁四十枚湯浸去皮共麩炒

右為細末每服二錢酒調下不拘時候微利為度

又方出聖惠方 治壓傷損筋骨或墜墮內損瘀血攻心

腹脹滿悶亂下惡血

水蛭七枚炒令微黃 硃砂三分 膩粉二分研入 蜚蠊七枚去翅

足炒微黃 乾漆半兩搗碎炒令烟出 竈突墨半兩

右為細末不拘時候以溫酒調二錢

又方

出冊後方

治被砒墜墮骨斷車碾馬踏牛觸胃腹破

陷四肢摧折氣悶欲死

以烏雞一隻合毛杵一千二百杵好苦酒一升相和
得所以新布搗病上取藥塗布乾再易覺寒振欲吐
不可輒去藥須更復上一隻少則再作并以地黃酒
佳

荊芥湯

出聖濟總錄

治墜墮損煩悶

方見本門傷墮吐唾出血類

蒲黃散

出千金方

治從高墮下有瘀血

蒲黃

八兩

附子

一兩

右為末酒服方寸匕日三服不止增之以意消息

導滯散

出聖惠方

治傷重物壓砢或從高墮下作熱五內

吐血不禁或瘀血在內胸腹脹喘麤氣短崩中

當歸

大黃

或加桃仁或蘇木或芒硝亦可如大便實可加大黃半兩別後下

右等分炒為末溫酒調下每服二錢不拘時候或呷

咀水酒各一盞煎一盞空心服

雞鳴散

出醫方大成

治從高墜下及木石所壓凡是傷損

瘀血凝積氣絕欲死并久積瘀血煩躁疼痛叫呼不得並以此藥利去瘀血即愈推陳致新治折傷神効

大黃

一兩酒蒸

杏仁

三七粒去皮尖

應驗加紅花一錢當

歸二錢

右研細酒一盞煎至六分盪瀝去滓雞鳴時服次日取下瘀血即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急摩開口以熱小便灌之

麝香散

一名接骨散
出肘后方

治從高墜下及打撲損傷

麝香

水蛭

各一兩

右用水蛭剉碎炒烟出研為末入麝香再研勻每服
酒調下一錢當下蓄血未効再服又治折傷用水蛭
熱酒調一錢食頃知痛更進一服痛止便將折骨藥
封直至安平方去

地黃糟裏方

出聖濟
總錄

治墜墮撲損筋內疼痛瘀血凝

滯腫熱不消

生地黃

洗切
細杵

酒糟

各一
觔

右拌和令勻隨腫處用藥逐旋以大碗盛甑上蒸熟
用布絹之類裏腫處日一易

桃仁散

出聖濟
總錄

療從高墜下傷內血在腹聚不出療

下血方

好大黃

二兩

桃仁

三十枚去皮
共及雙仁者

右搗以水五升煮取三升分為三服去血後作地黃
酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下

之虛極殺人也或用酒一椀煎去滓服之

治從高墜下或打撲損傷腰脇心痛

出危氏方

用木香調氣散加紅麴末少許童子小便同酒調空

心熱服如無麴酒亦可

治破血從高墜下損瘀在腹刺痛

出本草

以蒲蓆可常用此令卧破敗者良取蒲黃赤芍藥當

歸大黃朴硝煎服一方蒲蓆燒灰二錢酒服

橘子酒

出聖濟總錄

治墜墮打撲閃肭腰痛惡血蓄瘀痛

不可屈伸以橘子炒去皮破細每服二錢酒調未止
再作或用猪腰子一隻去筋膜破開入藥用葱白茴
香鹽濕紙裏熟煨細嚼溫酒下一方治氣滯腰痛橘
核炒香研酒漚去滓下青木香丸一方橘核入大蒜
內濕紙裏煨令香熟酒吃一半盞研爛入少炒麴為
丸用蒜白炒酒吞下俱治風氣腰痛及胸悶腰痛

豆汁方 療足痛從高墜下瘀血脹心面青氣短欲死
用大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之一方以大

金匱要略卷三十二
豆五升水一斗煮二升去豆服令盡或黑豆炒熟水煎服即甦加芎歸為藥酒煎更妙

又方

出朱氏集驗方

治墜墮腕折瘀血留滯衄鼻吐血

用生地黃搗取汁服一升或二升尤佳一方用米醋調傳瘡上

又方

出本草

治從高墜下瘀血脹心面青氣短者

用烏鴉翅羽二七枚燒末酒和服如吐血即見効如得左翅羽尤佳

又方

出聖惠方

療從高墮下若為重物所頓管得瘀血

用豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓內蒲三合投

中攪調頓服之不過三四服神良

雞鳴散

出三因方

治墜墮欲死兼打撲悶絕者

急以手袖掩其口鼻一食頃眼開先與熱小便服若
覺氣絕不能言急擘開口以熱小便灌或以酒小便
服火傷冷小便灌皆能起死甚驗

治為重物所頓

欲死

出十便良方

以半夏如大豆者為末內鼻孔中此療五絕法五絕
一曰溺絕二曰牆壁所絕三曰壓絕四曰自縊絕
五曰產乳絕並可用內鼻孔立活雖經一日而心溫
者亦可救

竹皮湯

出十便良方

治為兵杖所加木石所血在胃背

及脇中痛不得氣息

青竹

刮取茹

亂髮

各如雞子大二枚

右放炭火炙焦燥合搗篩以酒一升煮三沸上一服

盡之三服愈

治從高墜下傷損筋骨疼痛叫喚不得瘀血著在內

出本

草

以鼠屎燒為末以豬胎和傅痛上急裏不過半日乃

止

苦杖散

出保命集方

治從高墜下涎潮昏冒此驚恐併也

以苦杖不拘多少為細末熱酒調下如產後瘀血不散或聚血皆治之

療壓撲損傷

出本草

搗胡桃肉和酒溫頻服便瘥

治人忽被墜腸出

出本草

以冷水噴之令身噤腸自入也

治墜撲內損散敗血止痛及惡瘡發背等

出本草

以重陽日收取茄子百枚去蒂四破切之硝石十二兩碎搗以不津器皿大小約可盛內茄子者於器中先鋪茄子一重乃下硝石一重覆之如此令盡然後

以紙數重密封之安置淨處上下以新磚墊覆令得地氣不犯地氣至有五月後取出去紙兩重日中暴之逐日如此至二三月度已爛即開瓶傾出漚出滓別入新器中以薄紙蓋頭又暴直成膏乃可用內損酒調半匙空腹飲之再惡血散則痛止而愈矣諸瘡腫亦先飲酒半匙又用膏於瘡面塗之當覺冷如冰雪瘡乾便瘥其有根本在膚腠者亦可內消若膏久乾硬即以飯飲化動塗之

整骨丸

出楊氏家藏方

治從高墜下筋斷骨折內外皆損疼

痛難忍不問輕重並皆治之

白礬

一十二兩飛過

黃蠟

六兩

黃丹

蜜陀僧

另研

自

然銅

另研為末已上三味各四兩

乳香

另研

硃砂

沒藥

另研

已上三味各一兩

豬脂

一十二兩臘月者

右件用銀石器或新鍋內先下豬脂熬成膏去筋膜

滓次下蠟候鎔退火候稍冷方下蜜陀僧黃丹自然

銅末添慢火熬以柳木篦子攪候滴入水不散為度

擡下鍋子於冷地上入硃砂乳香沒藥白礬更以篋子攪勻丸如梧桐子大每服二十九丸熱葱酒送下葱切如絲於熱酒中以盞合少時勿出氣如昏困不能嚥藥者即用葱酒化開灌下仍將二三十丸切開於紙下以火炙之如不化入油少許隨所傷大小攤成藥靨恐此藥不黏以雲母膏塗靨周圍貼之良久痛變成痒若骨碎及蹉跌者並皆平正不成靨節其傷破處便生肌肉多年傷折每遇陰晦發作疼痛者亦可服不拘時候

又方

出永類
鈴方

用水蛭茴香各一兩先以茴香三錢同水蛭炒去茴
香又以茴香七錢微炒共為末用水煎蘇木加酒和
調烏藥順氣散一帖作三服又法硃砂水蛭竹膜絲
頭四味將砂炒蛭去砂用蛭為末竹絲燒灰和葱酒
調服

治從高墜下瘀血脹心面青氣短欲死者

用飛駁鳥

味甘
寒

翅羽七枚燒末酒服之得右翅者最

良飛駿鳥即雄鵲也若燒作灰以右接中散解者是雄也又燒毛作屑內水中沈者是雄也又其翼左覆者是雄

又方

用韶粉

味辛寒

一錢匕和水服之即瘥

治從高墜下頭破腦出血中風口噤

用黑豆

味甘平

一升炒去腥勿使太熟杵末蒸之氣遍

令甑下盆中以酒一升淋之溫服一升覆被取汗傳

膏瘡上

隆車落馬 附論

夫或因乘車馬或登陟危險誤多倒仆輕則蹉跌筋脈
蹴損不得伸屈甚者乃至踈折筋骨治宜速以養血脈
續筋骨之劑服之則其効速矣

方

乳香烏龍丹 治落馬隆車打撲閃肭損傷筋骨疼痛
悶亂活血止疼及中風癱瘓口眼喎斜婦人血風腰
腹四肢走注痛痺等疾

骨碎補

葫蘆巴

炒

破故紙

炒

川烏

炮去皮臍

蓯蓉

酒浸

牛膝

酒浸

金毛狗脊

牡蠣

燒赤

甜瓜

子炒

黑牽牛

赤芍藥

自然銅

燒赤醋
煎七次

川

棟子

茴香

牡丹皮

五靈脂

白芍藥各

兩

蒼朮

皮炒二兩去

官桂

半兩

細墨

七錢

木鼈子

七箇

沒藥

二錢半

乳香

二錢

右為細末研勻醋麪糊丸如梧桐子大每服七丸至

十九溫酒下日三服

神聖膏

出德生堂

凡跌傷後用此藥敷貼仍服後藥

赤小豆

木鼈子

去殼另研

草麻子

去殼另研

羌活

薑黃 草烏 血竭 大黃 知母 白芷 川

烏 白芨 白薇 防風

各一兩

右為細末和勻隨病大小用好米醋密調敷傷損處
乾再敷即痛止骨接

當歸散

出德生堂

治落馬墜車傷損

當歸 桂心 川椒 附子

各二錢

澤蘭 錢 芎

薊六錢

甘草五錢

沒藥

乳香

各二錢半另研

右為細末每服二錢溫酒調病上食後服病下空心

服三日筋骨相連二十日痊可

止痛虎骨散

出聖惠方

治馬墜傷損

虎脰骨

三兩塗酥炙微黃

敗龜

塗酥炙微黃

當歸

剉微炒

陽起石

酒煮半日細研

骨碎補

自然銅

細研

赤芍藥

甜瓜子

沒藥

薑黃

各一兩

右為細末每服以暖酒調下二錢日三四服

芍藥散

治倒仆筋脈蹠損

方見本門
悶衄類

芍藥湯

出聖濟
總錄

治墜墮倒仆蹠損筋脈

芍藥

一兩半

澤蘭

取葉
一兩

生乾地黄

焙三
分

桂

粗

皮半

附子

炮裂去
皮臍

牛膝

酒浸切焙
各一兩

蜀椒

目

并閉口者
炒出汗

右剉如麻豆大每服三錢水酒共一盞煎至七分去

滓溫服不拘時候

槐子煎

出聖濟
總錄

治倒仆諸筋蹠損

槐子

炒為末用酒一升浸一宿

桂去粗皮

秦艽去苗土

白朮

剉

續斷

附子

炮裂去皮臍各一兩

右除槐子外搗為麤末將槐子酒先煎次入豬脂半斤再煎沸入藥末再煎熟絞去渣磁合盛每服一匙溫酒調服不拘時候

虎骨散

出聖濟總錄

治倒仆蹴損筋骨疼痛

虎骨

酥炙別為末一兩

酒一升 生地黄汁一升

右將地黄汁并酒煎沸入虎骨末同煎數沸每服一

蓋溫服不拘時候

當歸湯

出聖濟總錄

治倒仆筋蹠損筋骨疼痛

當歸

切

芎藭

各二兩

熟乾地黄

焙四兩

右麤搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

地黄酒

出肘後方

治倒仆筋蹠不得展舒及瘀血不散亦

療馬墜

生地黄

洗切研八兩

酒三升

右共煎數沸去滓每服一盞溫服不拘時候

桃仁地黃酒

出聖濟總錄

治倒仆蹠損筋脈

生地黃汁一升

酒一升

桃仁

去皮尖別研一兩

右將地黃汁酒煎沸下桃仁再煎數沸每服一盞溫

服不拘時候

骨碎補散

出聖惠方

治一切磕損落馬碾著傷折等服之

接骨散惡血

骨碎補

一兩

木香

半兩

蒲黃

一兩

玄胡索

一兩

當

歸半兩剉

桂心

芎藭

各半兩

檳榔

一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

虎骨散

出聖惠方

治一切磕損落馬車碾失墜傷折疼痛

虎脰骨

二兩塗酥炙令黃

桂心

牛膝

去苗

淹藺子

續斷

澤蘭

郁李仁

湯浸去皮微炒各一兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

赤芍藥散

出聖惠方

治墜車落馬傷折內損疼痛

赤芍藥

芎藭

桂心

各一兩

買子木

夜合花

當歸

劉微炒

骨碎補

各三兩

右為細末不拘時候以溫酒調下二錢

牡蠣散

出聖惠方

治墜車落馬傷損筋骨疼痛皮肉破裂

出血不止

牡蠣

一斤濕紙裏後却以水洗更裏候乾用大火燒通赤

白礬

三兩燒令汁盡

黃丹

三兩

膩粉

雄黃

細研淨

麒麟竭

各一兩

雌

黃

半兩細研

麝香

二錢細研

右為細末仍於烈日中攤曬半日後入磁餅中盛如

有墮損及骨折筋斷用生油稠調塗之如已後瘡乾傳之

骨碎補散

出聖惠方

治馬墜車碾跣折呼叫疼痛聲音不

絕

當歸

一兩半微炒剉碎

骨碎補

牡丹皮

虎脰骨

塗酥

炙令黃

白芷

芎藭

赤芍藥

敗蒲

燒灰各一兩

右為細末每服以煖酒調下二錢日四五服

敗龜散

出聖惠方

治馬墜傷折止痛

敗龜

塗醋炙
全黃

虎脰骨

塗酥炙
全黃

牡丹皮

赤芍

藥熟地黄

桂心

續斷

各一兩

當歸

一兩半
剉微炒

右為細末每服以溫酒調下二錢日三四服

敗蒲散

出聖
惠方

治馬墜傷損筋骨疼痛內有瘀血腹中

疔刺不可忍

敗蒲

細剉

舊麻飩帶

各一握許
細剉用

亂髮

如雞子大
一團火燒

灰

當歸

一兩剉
微炒

赤芍藥

桂心

各半兩

桃仁

四十九枚浸去
皮共雙仁微炒

右為散每服四錢以水一小盞煎至半盞去滓不拘時候熱服

當歸散

出聖惠方

治落馬墜車諸傷腕折臂脚痛不止

叫不絕服此藥呼喻之間一服止痛三日筋骨相連昔公實錢季毅皆曾合以救人

當歸

炒

桂心

蜀椒

炒出汗

附子

各二分炮去皮臍

澤蘭

分

芎藭

六分

甘草

五分

右並熬令香篩酒服方寸匕日三丸是傷損皆服之

十日愈如小兒被奔車馬所損裂其膝皮內決見骨
即絕死小蘇啼不忍聞服之便睡十數日便行走其
神驗如此一方有檳榔一兩忌生葱猪肉冷水菰菜
海藻

五傷接骨丸

治墜馬傷折及閃肭疼痛不可忍

方見本門

打撲傷損類

五骨散

出聖惠方

治落馬墜車腕折骨碎筋傷腫損疼痛

不止

鯪魚項骨 獼猴項骨 虎項骨 黃犬項骨

野猫項骨

各一兩

天雄

半兩炮裂去皮臍

肉蓯蓉

半兩酒浸

一宿刮去皺皮炙乾

右味骨細剉用酒醋各半升浸一宿漉去炙令黃色候冷入二味藥同為細散每服二錢以溫酒調下不拘時候又將黃米半升作糊入散藥一分調令勻塗貼骨折筋傷處疼痛立止

大黃湯

出肘後方

治墮馬一切筋骨損傷腹中有驚風瘀

血煩悶不省人事此藥利大便去驚風或血

大黃

一兩切浸湯盛下

緋帛

如手大燒灰用

亂髮

如雞子大一團燒灰

用

敗蒲

一握三寸

桃仁

四十九個去皮共

甘草

如中指節一段

灸

灸用紗單布

一尺燒灰

右以童子小便量多少煎湯盛內酒一大盞次下大黃去渣三分溫服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被覆斯須通利數行痛楚立瘥利及浴水亦勿怪即瘀血治墜馬撲傷痛不可忍者

用仙鼠屎三兩細研以熱酒投之取其清酒服之立可止痛更三兩服便瘥仙鼠屎即蝙蝠屎也

療落馬墜車及墜屋坑踣傷身體頭面四肢內外刺痛

煩躁叫喚不得臥方

出肘後方

急覓鼠屎無問多少燒末以猪膏和塗封痛處急裏之仍取好大黃如雞子大以亂髮如鴨子大以人所裁白越布衫領巾餘布以裹髮外乃令火燒烟斷搗末屑以薄酒服日再三無越布可強用常布當預備

此物為要緊急用

療墜馬內損方

取蘆藥一小兩搗為末牛乳一盞煎五六沸和服或
以羊肉汁和服一日內忌菜極效蘆藥見陳
威本草

白膏 治一切墜落打撲及腫毒疼痛

柳白皮兩切半 白蠟錢四 鉛丹錢二 胡粉兩三 油

四 商陸根切三分

右先以熟油入柳白皮商陸根煎候變色去滓入諸

藥數攪良久膏成每用看腫大小以故帛或軟紙攤

貼

神異立効方 治馬墜損傷

桃仁

四十九粒湯浸去皮尖雙仁爛研

川大黃

一兩切剉碎微炒

敗

蒲

麻甑帶

各一握燒灰

亂髮

如雞子大燒灰

右為散以無灰酒三大盞煎至一盞去滓分為二服

食前服

沒藥散 治馬墜撲損內有敗血疔刺疼痛不可忍者

沒藥末

麒麟竭末

黃丹微炒

白礬燒灰各一分

右為細末不拘時候以溫酒調下一錢

沒藥雞子酒 治墮落車馬筋骨疼痛不止

沒藥

半兩研末

生雞子

三枚

細酒升一

右先將雞子開破取白去黃盛碗內入沒藥以酒煖令熱投於碗中令勻不拘時候溫服

治馬墜傷損腰肋疼痛不可忍方

益州麻布

一尺燒灰細研

蒲索

一握燒灰細研此索船家名繩索如無即以蒲

黃代

川大黃

三兩切細如大豆

右先以酒一大盞半浸大黃一宿煎三五沸去滓入前藥灰攪勻微溫分為二服如人行三二里再服當利出惡血片効

羊腦方 治被馬墜損腫疼痛不可忍

羊腦合

龜甲

一兩半肩

生地黄

三兩切

右以酒醑和搗如泥微熱裏損處冷即易之

烏頭散

治一切墜馬傷折損者先服此藥然後用手

接骨

當歸 草烏

白芷

各二錢半

右為細末每服半錢至一錢用溫酒調下微麻用手整骨平正方可用藥敷貼患處

當歸導滯散 治落馬墜車打撲損傷瘀血大便不通
洪腫暗傷疼痛昏悶畜血內壅欲死

川大黃

一兩

川當歸

一分

麝香

少許

右除麝香另研外為極細末研勻每服三錢熱酒一

蓋調下食前內瘀血去或骨節傷折疼痛不可忍以接骨類紫金丹服之或以醋煎服亦可

治墮車馬間馬鞍及諸物隱體肉斷疼痛方

以酢和麴塗之一方如肢體碎折者用小麥粉子炒黃好酒調敷趁熱用杉木夾住一方用小麥和醋蒸之搗爛裏所傷處一方麴和醋蒸裏傷處亦可

治墜馬失足或為物所壓痛極不可忍

先用香白芷末和降真末等分童子小便和酒調服

二錢外以澤蘭同當歸末搗爛微炒盒傷處止痛

治墜馬折傷

用沒藥一味能推陳置新生好血丸服此皆須研爛以熱酒調下効

治墜車落馬筋骨疼痛不止

用玄胡索一兩搗羅為散不拘時候以豆酒調下二錢

治墜馬拗損疼痛不可忍方

以桑根白皮五片為末水一斗煎成膏傳於損處已後終無宿血亦不發動一方用桑根白皮一片以水三大盞酒一大盞煎取一盞去滓以故烏礬可於損處大小搗藥汁裏冷即易之十遍痛止腫消

治墜馬撲損

用稻稈燒灰用新熟酒未壓者和糟入鹽和淋煎灰取汁以淋痛處立瘥直至骨損亦可淋好糟灰亦得不必新壓酒也

摩風膏

出聖
惠方

羌活 躑躅花 甘菊花 當歸 烏蛇 莽草

細辛 白薇各半兩 防風去蠶 桂心 鮫鯉甲

各三分 附子去皮 川烏頭去皮 皂莢去皮

芎藭 白芷 露蜂房 白芨 括蕒根 紫葛

蝟皮 杏仁湯浸去皮尖 漢椒一兩半 苦

參一兩 蠟五兩 猪脂三斤

右細剉以米醋二升拌勻經二宿後以火微微炒之

令乾用猪脂和藥以慢火煎一日以綿濾於磁合內
盛不令水汚如有傷折處將用摩之

挺子膏

出聖
惠方

治傷折

麒麟竭

沒藥

亂髮灰

蜜陀僧

丁香 麝

香木香

膩粉

雄黃

雌黃

自然銅

黑

狗肝膽

右各一兩細研先於鐺中鎔黃蠟然後入藥末熬鍊
成膏取一小竹筒子熱灌之待冷方可取出於黃丹

中出色若有患者先以熱水洗病上用生油於漆捺
中磨藥塗痛處立効

乳香膏 治傷折皮肉破冷久不合宜用長肉合瘡口

方見膏藥門
瘡腫傷折類

摩痛膏

出聖
惠方

治傷折筋骨腫痛不可忍

細辛

去苗
葉

牛膝

去苗各
半兩

駝脂

十兩

臘月猪脂

十二兩

木鼈子

去殼

丁香

別搗
為末

麝香

別研

羌活

去蘆
頭

芎藭

防風

去義

附子

去皮臍
生用

括萎根

各一兩

右除駝脂猪脂丁香麝香外細剉以米醋二升拌勻經三宿入鐺中抄令乾下駝脂及猪脂等以慢火再煎候諸藥焦黃色即住火用綿漚去滓後下丁香攪勻內磁合中盛傷折處取摩之

治為馬墜內損

出本草

用錦紋大黃一兩杵羅以為末用頭醋半斤同熬成膏丸如梧桐子大患者用溫醋七分盪化五丸服之

良久下瘀血

長安石史居嘗至通衢有從後呼其姓第者曰吾無求於人念汝有難故來救汝出一紙卷授石曰有難即用之乃治折傷內外損方書也明年因趨朝坐馬為他馬所蹠折足墜地又蹠一臂折家人急合此藥且灌且裹

至夜半痛止後手足皆堅牢如未傷時方出良方

用川當歸鉛粉各半兩鵬砂三錢同研令細濃煎蘇木汁調服一大錢匕損在腰以上先喫淡粥半盞然

後服藥在腰以下即先藥後食仍頻頻呬蘇枋汁別以糯米飲入藥末拌和攤紙上或絹上封裏傷處如骨碎用竹夾之乃以紙或衣物包之紙閉氣口宜紗絹之類其妙如此故表而出之

治墜馬撲損瘀血在內煩悶

右取東引杏枝三兩細剉微熬好酒三升煎十餘沸去滓分為三服空心下如人行三四里再服

治諸傷折淋熨貼燭

附論

凡傷折有輕重淺深久新之異治法亦有服食淋熨貼
燭之殊當詳所損之勢而藥之去毒散滯生肌長肉亦
各有序無致差紊乃明傷折之本末也

方

神驗摩風麝香膏

出聖惠方

治折傷蹉跌筋骨黯腫疼痛

及傷外風毒風口面不正但是傷風等宜用此軟筋
骨潤皮肉止疼痛

麝香

細研

虎脰骨

細辛

防風

去蘆

獨活

桂

心 當歸 芎藭 白芷 白殭蠶 生乾地黄

白芨 白薇 附子去皮臍生用 旋覆花 赤芍

藥 連翹 甘菊花 木鼈子去殼 天南星 牛

膝去苗 躑躅花 甘菰香 石斛去根各一兩 川椒

去目并開口者 括蕒根 烏蛇各一兩半 野駝脂兩十 蠟

五兩 鍊針兩 臘月猪膏斤二 醋 好酒各三升

右淨洗曬乾細剉入酒醋中浸三宿漉出陰乾却入

臘月猪脂駝脂內以慢火煎候白芷黃焦藥成以綿

瀝去滓入麝香末調勻以磁合盛有患者火上燂手
心點藥摩痛處五七度亦用溫酒調半匙服之

先花鹿散慰方 治傷折瘀血不散

先花 原蠶沙各三兩 生地黄二斤 生薑四兩 蜀

椒去目及閉口者 當歸各一兩 牛膝 桑根白皮 艾

葉 白芷各二兩

右細剉鹿搗以醋拌炒熟用青布裏熨之立効

淋燂芎藭湯 治傷折疼痛

芍藥

甘草

炙

蜀椒

去目及開口者

當歸

焙切

吳茱

萸

浸炒各一兩

桑根白皮

剉

澤蘭

各二兩

松樹脂

一兩

黑豆

一升研碎入松脂內炒

右麤搗篩每用藥三兩水一斗煎沸淋燥痛處立効

淋燥頑荆散

治從高失墜及一切傷骨碎并瘀血結

痛

頑荆葉

一兩半

蔓荆子

白芷

細辛

去苗

防風

去蘆

桂心

川芎

丁皮

羌活

各二兩

右為細末每用藥二兩鹽半匙葱白連根五莖將水五升煎五七沸去滓用手淋熨痛處冷則再換淋熨時宜避風暖蓋量病大小臨時加減用藥

治傷折浮腫疼痛膏

厚朴

去粗皮

白芷

各二兩

檳榔

芎藭

各一兩

桂

心二兩半

沒藥

麒麟竭

各半兩

當歸

三兩剉微炒

硃砂

三分細研

右為散以酒二升熬藥成膏於帛上攤貼於痛處立

効如食前熱酒調下二錢亦佳

桂附貼燭膏 治接骨因傷損筋脈時發痛楚遇寒則

甚一名止痛貼燭膏

桂去粗皮

附子去皮臍生用

乳香研

蜀椒去目并閉口者

炒出汗

白礬研

吳茱萸浸炒各一兩

生薑汁酒

各五合

右搗碎六味為散將薑汁并酒各五合共煎取七合入藥末調勻於油單紙上攤貼患處急裏縛之其痛

立定一方無白髮有白髮

應驗塗貼狢獠膏 治一切傷折并蹉跌骨碎壓腫曉
夜疼痛不可忍者

狢獠骨 穿山甲骨 狗食系骨 虎脰骨 野

狸骨 水獺骨 猫兒食系骨 各三兩 脰膂 三兩

右麁搗以米醋拌入瓶子以密封頭令乾以文火燒
令稍熟為度候冷取出搗羅為末磁器中密盛每用
時先以醋煮黃米粥看損折痛處大小入藥末半錢

調令勻攤於油單紙上裏之上面以綿裏繫縛重者
不過三度驗其傷折處骨先依法度排正後即封裏
如貼藥時疼痛先用溫酒調藥末半錢服之藥入口
其痛立定

塗藥方

乳香

綠礬

各二兩

骨碎補

川朴硝

川椒

目去

并閉口者

桔梗

去

白礬

燒令汁盡各一兩

鹽梅肉

炒乾

右為末煎米醋如膏勻攤於帛上貼之每日一易

塗貼方 治傷折跣損蹉跌黯腫皮肉疼痛

萊豆末

五兩

桂心

附子

川椒

目去

蛇床子

松脂

各二兩

吳茱萸

當歸

剉微炒各一兩

右為末用薑汁調如膏貼於患處乾即再換如有瘡

口不可用之

貼瘡敗龜膏

治傷折止痛消腫化毒氣散瘀血

敗龜

塗酥炙令黃

沒藥

川大黃

各三兩

百草霜

木鼈子仁

當歸

剉微炒

桂心

芎藭

各二兩

右為散每用之時先以好酒一升煎至半升下火停酒稍冷入藥末一兩却於火上重煎一時不住攪成膏攤於紙上貼

走馬貼爛乳香膏 治傷折骨筋疼痛不止

乳香二兩 蛇床子 皂莢炙去皮子 附子生用各一兩

桂心半一兩 芥菜子 赤小豆各三兩

右為末用生薑汁一中盞調如膏看傷損處大小攤於油單上封裏候乾即易之

當歸湯

治傷折車碾落馬蹉跌筋脈俱傷疼痛不可

忍先用通和氣血脈止痛

當歸

頑荊

藁本

蔓荊子

白芷

各二兩

芎

窮

丁香皮

各一兩

右為散每度用藥三兩入鹽半匙葱白一握漿水一

斗煎十餘沸漸添淋燥痛處日二用之

桂附散

治傷折筋骨疼痛

方見本門傷折疼痛類

洗瘡湯

治傷損

烏鵲飲 老干根 松樹兒 樟葉 忍冬藤

鷄脚草 烏拔樹兒

令洗者用之煎湯

虎骨湯

出聖惠方

治傷折後或人脚膝腰胯被冷風攻擊

疼痛行履不得

虎脛骨 桑根白皮 剉

五加皮

白礬

各二兩

松木節

樟木節

各十兩

川槿

去目一兩

右為散每度用藥三兩以水一斗煎十餘沸漸漸燥

痛處

慰藥方

出聖惠方

治傷折跣損蹉跌筋傷骨碎黯腫疼痛

筋脈急腫展縮俱難立坐不得

生地黃

二斤切研

生薑

半斤細切

川椒

去目研末

白礬

搗末

各一兩

蠶沙

五兩

乳香

搗末

羌花

各二兩

右相和於鑪中醋拌炒令熟以青布裏慰痛上并四

向筋急腫痛處冷即重炒慰後使用接骨止痛膏封

貼如是傷損骨碎即先須依法度排正碎骨及蹉跌

歸原後用綿裹柳木篦繫縛夾正便服補益丸散神効

軟骨塗藥方

出聖
意方

治傷折

海桐皮

木鼈

去殼

陳橘皮

各二兩

五加皮

兩半

遠志

心去

百合

各一兩

右為末每日以米醋調如膏勻攤於帛上貼之

慰藥方

出聖
意方

治傷折踣損蹉跌筋骨俱傷黯腫痛無

瘡口

生地黄

一斤細切

生薑

半斤細研

艾葉

川椒

去目及開口各

三兩

芫花

松脂

各五兩

右搗篩入前二味攪和令勻分為三分用醋三合於
鐺內炒令熟用熟布裏熨痛處冷則再炒熨之

又方

出聖惠方

生薑

一斤

芫花

鹽

各五兩

白芷

桑根

白皮

各五兩

兩

故烏氈

一尺

右細剉用醋一升炒令熟以絹裏熨之痛處冷即再

炒熨之三二十度

木鼈子貼燭膏

出聖惠方

治折傷筋骨

木鼈

去殼二兩

蜀椒

去目及閉口炒出汗

虎脰骨

酒炙

龜甲

醋炙各一兩

松節

二兩細剉醋一升炒令醋盡

右為細散用小黃米半升作稠粥調藥五錢攤於絹

上封裏損折處効

又方

出聖惠方

治傷折筋骨疼痛不止

松脂

三兩

當歸

剉微炒

細辛

白芷

各一兩

川椒

二兩

右為散用生地黄汁并醋相和調如膏臨時看患處大小塗貼每日換之

又方

出聖惠方

治從高失墜及一切傷折筋骨傷碎瘀血

結痛

黑豆升

乳香

白礬

桑根白皮

剉各三兩

接骨草五兩

右為末每用漿水一斗藥末三兩煎至七沸去滓用

手淋燂患處冷即換之

法煉黑豆熨藥方

出聖惠方

治傷折

生黑豆

三升

葱并根

三十根細切

右用青布裏之湯內煮承熟替換熨痛處立効

淋洗方

出永類鈐方

右用生葱切荆芥蓼杜當歸等入煎湯放溫洗或連翹防風白芷黃連

又方

出永類鈐方

用南蓼杜獨活藁本黃柏生薑煎洗如有口除薑蓼
損而青腫用此二味若肉冷痺痛骨斷而腫不可洗
傷口有膿水別用合口藥如前風流散

治涼血消腫

出永類
銓方

右用千金草即荊芥山查皮藁本石南藤皂角連根
葱煎水洗

普濟方卷三百十二

欽定四庫全書

普濟方卷三百十三

明周王朱櫛撰

膏藥門

總論

凡諸痛癢瘡瘍癰腫疽疹瘤氣結核拂鬱甚者皆熱五臟不和九竅不通六腑不和留結為癰近於火氣微熱甚癢熱甚則痛附近則灼而為瘡皆火之用也人之瘡腫因內熱外虛所生也為風濕之所乘則生瘡腫然肺

主氣候於皮毛脾主肌肉氣虛則膚腠開為風濕所乘
脾氣溫而內熱即生瘡也腫者由寒熱毒氣客於經絡
使血澁而不通壅結成腫風邪內作即無頭無根氣血
相搏作者即有頭有根壅盛則為膿赤根腫則為風氣
流潰也瘡有痛癢痛則為實癢則為虛非為虛為寒也
謂熱之微甚也癢者熱疾也故火旺於夏而萬物著鮮
榮美也灸之以火潰之以湯而其癢轉甚者微熱之所
使也癢去者謂熱令皮膚縱緩腠理開通陽氣得泄熱

散而去或夏熱皮膚癢而以冷水沃之其癢不去謂寒
氣收歛腠理閉密陽氣鬱結不能散越沸熱內作故也
瘡瘍皆為火熱而及腐出膿水者猶穀肉菜葉熱極則
腐爛而潰為污水也潰而腐爛者水之化也癰淺而大
疽深而惡勝熱血則為癰膿也瘍有頭小瘡也脉浮而
小癰胗也瘤氣赤瘤丹燥熱勝氣火之色也諸瘡之證
或腫或潰或硬或久不差者皆藉以膏劑去穢腐排惡
汁化死肌生良肉者正以此也

諸瘡毒腫方

十香膏 治五發惡瘡結核瘰癧疔瘻疽痔

沉香

麝香

各一錢

木香

乳香

甘松

丁香

白芷

安息香

零陵香

各五錢同為細末

藿香

五錢為細末

末

當歸

川芎

黃芪

茴香

芍藥

細辛

升麻

白欽

獨活

川椒

藁本

菖蒲

厚朴

木鼈子

官桂

各二錢

桃仁

五錢

商陸根

二兩

杏仁

栢子仁

松子仁

各五錢

槐枝

桑枝 柳枝 松枝 沒藥 輕粉 雄黃 硃

砂 雲母石 生犀角 亂髮灰 白礬灰

各二兩另

研如粉 蟾酥 猪脂 羊腎脂

各二兩

清芝蔴油

三觔 黃丹 一觔

右先用木炭火煉油香熟下十六味剉藥并四枝四仁熬至紫黑出火濾滓入脂酥煎十餘沸綿濾過油澄拭鎗淨火上煎油沸下丹藥柳枝作鉚不住攪熬一日滴水中成珠離火入十味藥末攪勻上火入雲

母輕粉八味輕煎沸出火攪食傾於磁盒內封密收
每用量瘡口大小緋帛上攤貼腸胃癰疽可作丸如
桐子大每服七丸空心溫酒下

消毒膏 治五發惡瘡消毒散腫

當歸 黃耆 川芎 杏仁 白芷 白欬 零

陵香 槐白皮 柳枝 木鱉仁 甘松

嫩者

各半兩到

乳香 沒藥 麝香 朱紅 硃砂

各三錢

各半錢

黃丹 芝蔴油 輕粉 黃蠟

半兩炒
紫色

一兩

一錢

半兩

右將剉藥油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去滓
下黃蠟候鎔開出火下丹藥急攪百轉下乳香麝香
硃砂等六味不住手攪至凝磁盒內收貯白光絹上
攤之

消毒膏 治一切腫毒結硬疼痛

玄參 葛根 木香 當歸 升麻 槐白皮

甘草 白欬 川芎 桃仁 浸去皮尖 杏仁 浸去皮尖

白附子 木通 赤茯苓 各三錢半 藁本 一錢半 牛

膝

亂髮

水洗浸淨令乾用二錢半

牡丹皮

蒼朮

去皮

細

辛

各一錢半

羌活

何首烏

天麻

各二錢

柴胡

去苗

一錢

木鼈子

去皮

白芷

各三錢

白芨

四錢

沉香

三錢

半

赤芍藥

防風

黃耆

各半兩

黃丹

一十三兩好者

鵬日澄清芝麻油

一觔四兩

右藥並剉同亂髮一處用油浸七日七夜於淨石鍋或銀器中以慢火煎候白芷焦黃色放溫以綿濾去滓於磁罐子內密封三日三宿候取出傾於鍋內慢

火輕溫再濾去滓傾出磁碗中用慢火再熬動次下黃蠟一十五兩用竹鉚子不住手攪令勻次下黃丹再攪令勻以慢火再熬動取下攪令勻續次再上火三日方得膏成於磁盒內密封每用時軟白絹上攤藥貼患處

神效鬼哭膏 治杖瘡不疼不發無痕及治癰疽遠年惡瘡腫毒風寒暑濕疼不可忍者

香油

五觔

柳桃槐桑枸杞枝

四寸長

蘇木 降真

節

錢四

甘草

錢三

防風

錢二

川烏

錢二

草烏

錢二

半夏

錢二

黃蘗

錢一

槐花

錢二

紅花

錢四

厚朴

錢二

黃連

錢五

苧麻

錢三

江子

錢二

牙草

錢四

天花

粉

錢二

川棟

錢二

當歸鬚

錢三

川椒

錢二

南星

錢四

五加皮

錢二

杜當歸

錢四

穿山甲

錢二

蒼朮

錢二

白芨

錢二

木鼈子

錢二

檳榔

錢二

川芎

錢二

貝

母

錢二

白芷

錢二

婦人油頭髮

團一

右將前藥同五枝一處入油熬至藥似灰黑色用鉄

簞籬撈去滓離火候稍溫下黃丹三十五兩用槐條攪勻再入火畧滾一兩沸藥鍋離火再下乳香沒藥血竭末各一兩攪勻用生麻布濾入別器內將麝香一兩研輕粉七錢拌在鍋內和勻候經一宿用

紫金膏 治諸般惡毒

乳香 沒藥 當歸 人參 羌活 獨活 蒼朮 白芨 黃蘗 草麻子 木鼈子 桔梗 烏頭 五倍子 知母 貝母 白芷 防風

藁本 蛇蛻 陳艾 苦參 赤芍藥 良薑

亂髮 蔥白 桃枝 柳枝 槐枝 米醋 雲

母石 甘草 巴豆 丁香 白欬

右各等分研碎內除蔥白桃槐枝大蒜米醋一大碗
鍋內煮三四徧下香油一觔熬至七八沸去滓每用
黃丹半觔下前已碾藥味入油熬用桃槐枝一順攪
至千餘徧待勻住火滴水中不散為度傾入水中出
火氣如稀即再熬火堅則加油勻之忌孝子婦人雞

犬見

白龍膏 治一切惡瘡焮赤腫痛

沉香 黃耆 白芍藥 防風 白芷 白

各二錢半

茯苓 白檀 木香 桔萎根 川芎 白朮

去皮

甘草 白芨 白附子 桔梗 白

各二錢半

各二錢

微生乾地黃 白欽 當歸 杏

各一錢

半兩

洗焙半兩

仁桑白皮 桃仁 木鼈子

湯去皮尖

湯浸去皮尖各二錢

去殼

人參 麝香 獨活 川升麻 槐白皮

去蘆各一錢半

零陵香

各一錢半

臈日澄清芝蔴油

一觔二兩

苦參

一錢

右並麤剉用油浸七日七夜於淨石鍋或銀器中慢火煎候白芷焦黃色取下以綿濾去滓於磁罐子內密封澄三日三宿候取出傾於鍋內以慢火輕溫再濾去滓傾磁椀中用慢火再熬動次下黃蠟十四兩用竹鉚子不住手攪勻放溫次入丸粉再攪勻以慢火輕熬動取下攪令勻續次再上火三日方得膏成於磁盒內盛密封每用時軟白絹攤貼患處

烏龍德生膏

治一切惡瘡腫毒及小兒腫毒脾癖等

之類堅硬者

黃芪

青木香

連翹

玄參

木鼈子

去油

生地黃

桃仁

去皮

防風

川芎

白芷

羌

活白芨

白欬

金銀花

各一兩

革麻子

三百枚去

殼

亂髮

一兩燒灰

桂花油

五錢

五香連翹湯

人

參敗毒散

復元通氣散

十奇內補排膿散

各五

錢一

貼

右將黃芪等十七味五香連翹湯四藥呔咀用小油
三觔半入鐵鍋內先浸五日却用慢火煎至藥味黃
黑為度以槐柳條一握不住手攪再用重絹濾去滓
秤淨油三觔先將黃丹一觔半炒黑色下小油一處
於慢火同熬得所滴入水中不散成珠後下

雄黃

血竭

乳香

另研

沒藥

陀僧

輕粉

龍骨

楓香

各五錢

麝香

一錢加蘇合油半兩大妙

右將雄黃等藥末下前膏內化開攪千餘徧和勻又

試水中得所成膏藥可攤為度如堅少加小油如軟
加些黃丹須要攪勻成膏切忌雞犬婦人孝子見須
誠心靜意修合如小兒脾疳諸癖等症量病堅硬大
小用紙或緋帛攤藥貼之候藥力盡自脫下再換小
兒疳瀉痢證貼肚皮上咳嗽貼脊梁中心其病即愈
紫金膏 治瘡腫疼痛辟風斂瘡

當歸 續斷 骨碎補 桂去粗皮 附子 澤蘭

芍藥 白芨 牛膝 羌活 芫花 木香 騏

麟竭

生乾地黄

白薑

白附子

各一兩

沉香

丁香

各半兩

枯蘂

二枚大者

烏蛇肉

白欬

白芷

玄參

二十三味同炒

杏仁

桃仁

去皮細研各二分

右入麻油四觔猪脂一觔半野駝脂三兩用文武火

鍋內煎黑去滓再入乳香末三兩松脂六兩更煎拌

後濾去滓細羅鉛丹三觔別炒紫色旋於藥油內煎

柳枝攪紫色去火滴水內成珠即傾入磁器內盛每

用看瘡大小用之

滅癰膏 治諸色癰疽惡瘡腫差後有癰痕

安息香

一作麝

礬石

狼毒

羊躑躅

烏頭

附子

野葛

白芷

烏賊骨

皂莢

天雄

芍藥

芫薺

赤石脂

大黃

當歸

莽草

石膏

乾地黄

地榆

白朮

續斷

鬼臼

蜀椒

巴豆

細辛

各一兩

右為末用煎成猪脂四觔和以此為準煎三上三下以鹽一大匙下之膏成患毒者與服摩之忌孝服及

妊娠婦人若減癥者以布揩令傷傅之鼻中息內者
取如大豆許內鼻中如瘀血者酒服棗核大痔瘻者
綿裹梅子大內下部中風者摩患上崩中者亦宜減
癥取少許和鷹屎白傅之修合宜用臘日

摩風膏 摩風膏止癢消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡肌
肉裂破

黃芪

去粗皮一兩一錢

白芍藥 茅香 甘草 防風

各二錢半

當歸

去蘆

白芷 杏仁

浸去皮尖

桃仁 藿

香葉

去梗

零陵香

檀香

川芎

各三錢

白附子

沉香

白芨

白欬

天麻

獨活

木香

各一錢半

木通

二錢

龍腦

研四錢

木瓜

剉一百枚

黃蠟

夏用十二

兩半冬用九兩半

右藥剉用清油二觔三兩浸七日淨石磁銀器中慢火煎候白芷微黃綿濾去滓於淨磁罐內密封澄一宿再濾過於磁碗中慢火再輕溫熬動次下黃蠟攪勻放溫次下研細龍腦摻面於磁盒內盛每用少許

摩擦患處

至聖膏 治一切瘡癰腫毒

蒴藿 大黃 當歸 夜合花 白皮 白欬 槐

白皮 白芷 細辛 去苗葉 天麻 芎藭 槐枝

柳枝 敗龜 虎骨 附子 去皮臍各半個 乳香 細研二錢

麝香 細研二錢 砒霜 細研半兩 自然銅 細研一分 膩粉 研半

分 生黃 研半兩 鉛丹 十二兩 定粉 研半兩 清油

半 二觔

右除研藥丹粉外細剉先熬油令沸次下諸藥煎候
白芷赤黑以綿絞去滓再煎下丹柳鉚攪候變色黑
滴水中成珠軟硬得所次下乳香等研藥更攪勻磁
盒盛發背魚臍瘰癧並貼之日二上

乳香中黃膏

白芷 當歸 赤芍藥 生地黃 地龍 穿山

甲 血竭 防風 大黃 玄參 苦參 藜蘆

蒼朮

錢各三

草烏尖

兩半

牙皂

條十

兩頭尖

無半兩

烏代

南星

錢二

木鼈

十五枚

草麻

一百五十枚去殼

乳

香

沒藥

另研一兩不入油浸

蜂房

錢二

生葱

二把

桃柳

槐枝

各半兩

右用桐油五兩浸三兩時鍋內文武火慢慢熬草麻

子焦穿山甲葱白焦黃用布濾去滓藥油另收入松

香在鍋內熬開藥入在內同煎化又用布濾去滓藥

油與松香同熬以桃柳枝攪勻滴水散中不散為度如

硬入油少許藥嫩加松香方入乳沒末攪勻再以布

濾入水盆中候冷用水抽洗黃色為度

萬痊膏 治一切瘡瘍已潰未潰膿水不絕及灸瘡灸不差減生肌每用粘在鐵釵子上炭火炙消攤紙上貼患處兩日一換之

乳香

沒藥

各四錢
半另研

半夏

不剉

當歸

續斷

杏仁

桃仁

巴豆

和皮
槌碎

木鼈子仁

芫花

大戟

川芎

熟地黄

芍藥

蒼朮

防風

乾薑

生用

蛇床子

桂

各半

松枝

桃枝

新者
各二

兩

亂髮

二碗如
馬毼大

澄清芝蔴油

十
觔

右將藥下油內浸七日慢火煎熬令鐵杓攪至半夏黃黑色為度竹篩濾去滓另研血竭三錢半下油內攪勻用綿濾在盆器中澄去滓油揩鍋并杓至淨再用綿濾入鍋內入油每一觔用黃丹五兩黃丹性緊只用四兩半准脩冬春秋間使用如夏月用者使黃丹五兩二三錢並看丹急慢調品用慢柴火燒熬不住手攪令變黑色微益武火至沫下依前用慢火熬

候黑烟出住火如此二日後用木炭火養仍不得暫住手攪直至通前四五日攤紙上不湮硬軟得所盛在磁器內方欲凝時用絹子裹水銀搭在膏面上如用時揩去水銀如此不至膏藥上面一重乾了臘月煎熬佳

萬靈膏 治一切惡瘡腫毒

青木香 連翹 木鼈仁 桃仁 草麻仁 巴
豆仁 地黃 白芷 防風 川芎 黃芪 羌

活當歸 黃連 蓬朮 露蜂房 槐枝 柳

枝

桃枝

已上皆
吹咀

沒藥

研

輕粉

各半
兩

黃丹

十五
兩

右將前藥入真香油三十兩浸春秋七日夏五日冬
十日慢火熬至巴豆革麻仁抹開如泥黑色濾去滓
逐旋入丹以槐柳枝不住手攪候丹盡然後下乳沒
滴水中成珠為度提起離火攪至微溫入輕粉攪勻
至冷以碗覆地上出火毒收藏時先用真蛤粉撲裏

却入淨瓮器內收貯用之

黑金膏 治男子婦人癰毒惡瘡臙瘡發背風毒瘡

黃芪 黃連 黃蘗 黃芩 大黃 防風 白

欽 白芷 南星 花粉 荊芥 猪牙皂莢

露蜂房 木鼈二枚 烏頭小者一枝碎 蓖麻子十枚

桃仁 杏仁 柳枝 槐枝 栢枝稍各五錢

右用香油一觔同煎藥焦濾去滓候溫入黃丹半觔入五靈脂為末乳香沒藥末各三錢再煎滴水碗內

為膏油煙起便住欲用以帛攤之

太乙靈應膏 治諸般惡瘡惡毒並可外貼內服一丸

每丸如櫻桃大蛤粉為衣各隨後項飲子服之亦治

杖瘡

玄參

半兩

生地黄

半兩 補血

大黃

二錢 同上

黃蘗

三錢 同上

黃芩

二錢 同上

槐花

二錢 同上

紅花

二錢 活血

白芷

半兩 定痛

官桂

半兩 同上

血竭

半兩 化血

當歸

一兩 活血

地榆

二錢

泄熱

川芎

四錢 骨疼

乳香

半兩 定痛

沒藥

三錢 追膿

赤

芍藥

半兩
排膿

杏仁

二十一枚
去尖解毒

防風

三錢
活血

猪牙

皂

三枚
去風

白膠香

四兩
定痛

劉寄奴

四兩
泄熱

右藥以香一觔剉碎於油內浸春五夏三秋七冬十日浸畢就文武火熬待藥枯黑如炭然後退火令其白冷將粗布一幅濾過枯藥不用將藥油再入鍋內熬先以黃丹十兩新瓦炒丹紫色為度每熬油一沸入丹二兩熬至五沸入丹了畢前後俱用柳枝條槌碎去其末攪之用水滴藥凝而不散方成膏待藥溫

用青椀盛貯不用水浸三兩日去火毒然後攤貼患處內服飲子見本門內外諸疾類

神仙太乙膏下木通膏 治諸瘡腫四時可用若未成膿即消已成膿即破

春用

木通

三兩

白芷

細辛

去苗葉

摩勒香

各二兩

夏用

木通

續斷

各三兩

白芷

三兩半

黃芪

芍藥

二兩

秋用

木通

薰陸香

各三兩

黃芪

二兩

白芷

一兩半

冬用

木通

黃蓍

木香

各二兩

當歸

剉焙二兩

芳藟

一兩

半

摩勒香

三兩

薰陸香

一兩

右各依四時並咬咀以清麻油二觔煎候白芷黃色即去滓絞取油放冷下黃蠟五兩候消盡入鉛丹十兩先下六七兩看硬軟得所即止亦不須入盡十兩

以急火煎用柳鉶攪勿令住手點物上色如漆即膏
成用藥先嚼少鹽擦瘡上次貼之

無比膏 治諸般癰疽瘰癧發背惡瘡

香油

一觔
二兩

黃連

黃蘗

當歸

木鼈子

白

芡

白欬

何首烏

赤芍藥

桃仁

川芎

生地黃

熟地黃

南星

半夏

各三錢

巴豆

四十

枚

防風

草烏

白芷

白芍藥

各三錢

右將香油煎至黑色去滓次入黃丹半錢又入黃蠟

一塊乳沒韶粉各半兩煎至熟任取用

當歸膏

治諸般癰疽發背瘰癧惡瘡

當歸

川芎

木鼈子

穿山甲

草麻子

敗

龜板

油頭髮

白歛

白芨

白芷

草烏

四物湯

貼一

敗毒散

貼一

已上香油一觔於罐內浸此藥春五夏三秋七冬十

日然後用松香三十兩夏使油四兩冬使油四兩半

次用

乳香

一兩

沒藥

一兩

白竭

少許

麝香

少許

龍骨

三煨

錢

白礬

半兩飛

右為末待松香入油用槐條攪勻文武火熬去烟淨入藥滴入水成珠子則膏成水浸餘下油或十兩或九兩使黃丹四兩槐柳桃枝各七寸杏仁再煎勻烟淨用藥末半兩乳香半兩皂針攪勻成膏收於罐內大小攤之

萬應膏

治一切瘡瘍初生腫焮甚者無問大小以膏

向腫痕貼之煎蔥白水熱淋兩炊時良久再淋腫消
為度如瘡老不能差者亦可飲取膿

黃芩

大黃

各二兩

白欬

一兩

黃蘗

芍藥

白

芷

黃芪

木鼈子仁

杏仁

當歸

白芨

生地黃

官桂

玄參

去皮各五錢剉

沒藥

乳香

各五

錢研

黃蠟

一兩

芝麻油

三觔半

黃丹

一觔

右將十四味藥入油內浸一宿絕早入砂鍋慢火熬
用生柳條攪至申時以焦褐色出火去粗滓又重綿

濾過入丹再熬滴水中成珠不散出火絕烟入乳香
沒藥黃蠟攪勻用磁器內收貯於土內埋七日取出
攤用

應痛膏 治癰疽及諸瘡毒

當歸 秦艽 何首烏 敗龜 白欽 白芨

白朮 白芷 杏仁去皮尖 木鼈子仁 芫薺

蜜陀僧煨研各半兩用麻油八兩熬前藥
令杏仁黃黑色為度去藥滓後入 乳香

研 驢驘竭研 沒藥研 風香子研各
一分 鉛丹

三兩

右先用油煎前十三味去滓入後五味再熬用柳枝攪令黑色膏成為度如是發背加附子末一分同熬勻紙上攤貼

保安膏 治一切瘡腫

當歸

焙切

附子

去皮臍

芎藭

防風

去叉

白欬

升麻

細辛

去苗葉

側柏

草薢

各一兩

桃仁

去皮

甘草

桑根白皮

垂柳枝

白芨

綿黃芪

白芷 白殭蚕 各半兩 鉛丹 研五兩 雄黃 研 麝

香 研

硫黃 研半兩

杏仁 去皮三分

丹砂 研一分

右咬咀以麻油二觔於磁器內浸藥一宿次日內當
中文武火煉候稀稠得所綿濾去滓入黃丹鉛砂麝
香硫黃等物再煎須臾息火別入黃蠟四兩凝藥候
稍過傾入磁器內盛之勿令塵汚其藥滓可再用清
油浸一宿再煎候稀稠入諸藥少許為膏用之難治
瘡只此可療發背酒調兩匙日二服外貼二日換瘡

癰瘻瘡疽風腫癰疔癰腎癰發髮腦發牙馬墜破
一切無名瘡蛇虫咬並貼之折傷筋骨酒服半匙箭
叉骨貼之自出喉閉含之即通產難及胎死腹中並
酒化下半兩血氣衝心生薑自然汁加小便同煎溫
酒化下一匙但諸惡瘡數年不痊者以鹽湯先洗然
後貼之其効如神

透骨金絲萬應膏

牛膝

一兩
研

木鼈子

一兩
研

當歸

半兩
剉

金剛骨

九錢

自然銅

半兩

革麻子

二兩切破

川烏頭

二枚切破

紫花地丁

半兩切

白龍骨

半兩為細末

已上藥用小油一觔浸一宿慢火煎復入桃柳槐枝

同熬藥焦綿濾去滓入黃丹六兩熬二沸次入

白膠

半兩

乳香

一錢研

白丁香

一錢

雄黃

一錢

沒

藥

一錢

蜜陀僧

一錢

右研細同熬勻再用綿濾過看硬軟取之收貯隨瘡

大小紙上攤貼

血竭膏 治發背惡毒瘡腫

川當歸

去蘆酒洗

白芷

大黃

黃蘗

去粗皮

黃連

去須

木鼈子仁

皂莢

去皮子弦

杏仁

去皮尖生用

漢

椒

苦參

去蘆

露蜂房

各一兩

男子亂髮

一兩

號

丹

羅過六兩

乳香

別研

沒藥

別研

血竭

各二兩另研

右除乳沒血竭外餘藥剉碎令勻用真麻油八兩浸一宿却入鐵鉚內文武火煎令髮焦為度綿濾去滓取油秤過多少再入鉚內煎令沸每兩清油入號丹

一字柳枝攪不住手候其丹加減看軟硬得所就水中試之不粘手為度再入乳沒血竭三味攪勻候冷取出皮紙就熱火上隨瘡口大小熨開剪去四邊紙角貼瘡口上合藥宜辰日天德月德天醫吉日為佳

萬金膏

治諸般惡瘡

五倍子

錢一

赤芍藥

白芷

大黃

官桂

川

芫

玄參

乾地黄

各二錢半已上第一次煎

虢丹

四兩第一次入

當歸

二錢半

羌活

雲母

別研各一錢

巴豆

三十五粒已上

第二
次煎

乳香

別研

白膠

別研各
錢二

滑石

別研
錢一

沒

藥

別研各
錢二半

號丹

四兩第
次入

右各細剉用清真蘇油一觔先將半觔入銚煎沸下
五倍子芍藥等八味以柳枝一條攪油候藥焦色用
綿濾去滓再將藥油入銚傾畧沸下號丹四兩打轉
看紫色將油一兩點滴在水面成珠即便傾出安穩
處再將清油半觔如前煎沸下當歸羌活雲母巴豆
青柳枝皮指面大一二十片同煎候藥待焦色用綿

濾去滓再藥油下乳香滑石膠香沒藥訖丹同煎候
如前紫色滴水中纔成珠却將前煎藥油傾作一處
同前打勻為度煎藥時不要火大緊恐煎過藥味昔
有一人頰煩間苦一漏瘡年餘用此膏藥兩枚而愈
後以治他人亦多驗

松脂膏 治一切癰疽發背潰後日夜痛疼口不合

松脂

一

豬脂

半

大黃

一

白蠟

四

細辛

防風

黃芩

芍藥

白欬

當歸

芍藥

莽

草黃蘗

白芷

黃連

各半兩

麻油

半兩

右咬咀先煎二脂白蠟令烊次內諸藥三上三下火用緩以綿絞著水中為餅取少許火炙之傅油紙上

貼瘡處

一方有黃耆一兩一方無麻油

善應膏

治癰疽毒腫

當歸

白芨

桂

白欬

白芷

木鼈子仁

杏仁

各一兩判如豆

黃丹

三觔

油

五觔

乳香

亂髮灰

沒藥

各半兩

黃芪

當歸稍

各加二錢末

瀝青

少許

右將藥油內煎令焦黃濾去滓再煎清油沸下黃丹
濕柳木鉀不佳手攪熬六時展滴水中成珠住火入
沒乳黃芪當歸稍末攪盒收貯

神聖膏 治一切惡瘡

當歸

半兩

沒藥

三錢

白芨

半兩

二錢

乳香

三錢

藁本

半兩

琥珀

半兩

二錢

黃丹

四兩

木鼈子

五枚

去皮

膽礬

去皮

槐

粉霜

一錢

黃蠟

二兩

白膠

三兩

巴豆

二十五枚

去皮

槐

去皮

槐

桃枝

一百二十條

各一把

清油

一兩

助

右將藥內油煎令焦黃濾去滓再煎清油沸下黃丹
濕柳木鉀不佳手攪將油澄清再熬成膏用緋絹攤
凡是腫毒惡瘡皆可貼

神效膏 治一切癰疽發背潰後肌肉不生

當歸 二兩

白芷 一兩半

乳香 三分細研

松脂 一兩

芳

薊 一兩

白欬 一兩半

緋帛 半兩細研

亂髮灰 半兩細研

甘草 一兩半

黃丹 十兩

木鼈子仁 三枚

杏仁 一兩湯浸

去尖
雙仁

木香 一兩半

黃蠟 二兩

麻油 二升

右取油安鐺內煉令香熟將八味藥細剉下油中浸一宿以文武火煎白芷色黑赤濾去滓下松脂蠟乳香緋帛髮灰等更煎令消以綿濾去滓入鐺內下黃丹不住攪變黑光色滴水中為珠則膏成用磁器盛每用以故帛攤貼日二易

乳香膏 治癰疽發背及一切惡瘡

乳香

兩

附子

生用
五兩

烏頭

木鼈子仁

各一
兩

當歸

秦艽

各一
兩

紫草

去苗
三兩

蘇枋木

剉五
兩

頭髮灰

一兩

清油

二十兩

楓香脂

五兩

松脂

二兩

黃蠟

五兩

鉛丹

二兩

沒藥

一兩半

右將藥先煎前九味候色黑去滓次下乳香等六味依次等逐味火熬柳木鉶不住手攪候熬成膏滴水中成珠為度攤紙上看瘡大小用之

金寶赴筵膏

治諸惡毒瘡并一切疔瘡等證

大黃

黃芪

地龍

去土

當歸

龍骨

海藻

各半

兩

乳香

沒藥

各二錢

腦子

一錢

江子

一十一枚

去皮

麝香

許少

粉霜

朴砂

穿山甲

輕粉

各三錢

右用蕎麥灰一斗水一斗煎淋灰三復淋之汁煎三分之下用雲裏鴈糞五錢煎十來沸提起放冷澄清再熬入大黃末煎三沸次入朴硝化減各三兩每藥一兩加入石灰三兩黃丹半兩逐旋攪之待煎滴水中直到底不散方好提起用瓶盛如用入麝香腦子保安膏 治男子婦人癰疽發背疔腫瘰癧瘡癤諸般腫毒異證

香油

三觔

木香

半兩

木鼈子

二兩

當歸

一兩

赤芍

藥

三兩

白芍藥

三兩

白芨末

十兩

乳香

半兩

沒藥

半兩

黃丹

八兩

柳枝

二十根

桃枝

一十四根各長二寸半

沉香

二錢半

右藥各剉碎用香油三觔浸煎內除乳沒黃丹煎藥
試白芨黃色為度去藥滓將油再熬沸下黃丹柳枝
急攪滴油水中不散看老嫩下乳香沒藥再試傾入
水中出火三日用

白膏

治一切風熱毒腫及臟氣鬱結丹石發動結為

癰疽瘰癧諸瘡腫未破即令消散久漏浸淫膿潰淋

瀉並治之

白欬

白薇

白芨

白芷

薤白

各半兩剉洗以青油一觔

煎至半觔去滓

黃芪

甘松

藿香

零陵香

防風

當歸

各半兩再入前油煎去滓

定粉

二兩

黃蠟

寒水石

三兩

煎過去水氣研

右將藥煎滴水成珠為度磁器盛之以腦子少許糝

其上煎時忌鐵器以柳枝攪

萬聖膏 治癰疽瘡癰瘰癧已成未成已破未破及風

毒眼貼太陽穴一切蛇虫犬傷皆可

當歸 黃芪 防風 香白芷 五倍子 生乾

地黃 白欽 白芨 赤芍藥 玄參 乳香

沒藥 各半 黃丹 六 油 一

右藥咬咀入油煎黑色却入乳沒同煎用綿濾去滓
將藥油熬漸入丹用柳枝攪候黑滴水中不散為度

入地穴三日出火毒用

芫薺膏 治諸般癰疽發背

川芎

微泡

當歸

皂莢

去皮核

白芨

赤芍藥

何首烏

無名異

木鼈子

穿山甲

火炮

黃蘗

半夏

乳香

沒藥

各等分

右咬咀用香油一觔藥末三兩春秋一觔油用藥四兩冬用六兩藥夏用二兩藥夏月加黃蘗三兩冬加一兩春秋加二兩槐柳枝攪之滴水如珠可用

青龍五生膏 治癰疽痔瘻惡瘡膿血出者

生梧桐白皮 生桑白皮 生青竹茹 生栢白

皮 生龍膽各五兩 蜂房 蝟皮 蛇蛻皮 雄

黃 雌黃各一兩 蜀椒 附子 芫薺各五分

右㕮咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭火上炙乾擣

篩以豬脂二升半微火煎攪令相得如飴著末脂中

新白磁器中盛稍稍隨病深淺傅之并以清酒服棗

核大旦服

犀角膏 治五癰惡瘡結核瘰癧疔瘻疽痔

當歸 川芎 黃耆 白芷 白欬 杏仁 木

鼈子 官桂 乳香 沒藥 各一兩 黃丹 二兩 清

油 五兩 亂髮灰 半兩

右將前八味細剉於油內先浸一宿於木炭火上熬至白芷杏仁焦濾去滓澄清再煎油沸下丹以柳木鉶不住攪旋滴藥水中如珠不散出火候一時辰下乳沒髮灰攪勻於磁盒中收依常法攤貼

勝金黑膏

治癰疽發背諸般惡毒瘡癰

當歸

蓮朮

玄參

肉桂

生地黄

續斷

赤芍藥

香白芷

大黃

槐枝

柳枝

香油

黃丹

右各等分四分呖咀油浸三日熬去滓再熬用柳枝攪下丹滴水不散為度

勝金膏

治惡瘡疼腫惡癰

穿山甲

一兩

白膠香

當歸

切

沒藥

乳香

血竭

各半
兩研

南星

黃蘗

各一
兩半

黃丹

一
觔

清油

二觔

木鼈子

一兩
研

赤芍藥

三兩
半

青柳枝

四
指

長十

莖

右將前七味與油以文武火熬候柳枝黑色佳火綿
濾去滓入水不散入後五味攪勻丸彈子大油紙裹
盛磁器內收

神異透骨膏

治遠年近日一切惡瘡毒注瘡等消腫

定痛生肌

露蜂房

細剪至
極浸

杏仁

去皮尖
各五錢

清油

十兩

穿山

甲

四錢

當歸

一兩

木鼈子

八枚
去殼

白膠香

四錢
明者

蛇蛻

五錢少鹽
水洗淨

號丹

四兩

連須葱

十莖

乳香

沒藥

各二錢

男女亂髮

洗淨如鷄子大
童男童女者

右用清油浸藥一宿慢火熬諸藥黑色生絹帛濾去

滓復時將所濾油慢火上再熬却將黃丹入油長柳

枝槐枝不住手攪後有微烟起即提起藥銚滴水面

上凝結成珠膏成矣攪無烟却入乳沒丹攪勻傾磁

器內新汲水一日一換將藥器放水內三日出火毒
此膏可加玄參半兩黃芪四錢

白龍膏 治五癰惡瘡及湯燒凍破潰爛止痛生肌清

血脉消毒散腫通氣脉如神至可無癰痕

黃蠟

半觔

定粉

半觔 另研

輕粉

半兩 另研

乳香

三兩 另研

白薇

桑白皮

各一兩

白芷

白欬

黃芪

商

陸根

柳白皮

各一兩

杏子油

一觔如無
麻油代之

右藥剉油內揉浸三日於木炭火上煎白芷黃色瀝

去滓於油中下黃蠟乳香後鎔開出火再濾候微冷
下輕粉急攪至冷磁盒內收每用緋絹上攤貼

大聖膏 治發背瘡口未合

當歸 柳根白皮

切各二兩

桂心

一分剉

槐實 白

欽 白芨

剉

沒藥

藥皮

剉各一兩

鉛丹

研

乳

香

研各半兩

麝香

研一分

蘆薈

半兩

右用臘月猪脂半觔黃蠟四兩清油半觔同前八味
煎候藥焦色去滓再入後四兩熬成膏以磁餅盛地

內七日取出將熟絹片留孔攤貼瘡口上去盡惡物

口自合

萬靈膏

清油

八兩

油髮

一兩

側柏皮

一兩

瀝青

一兩

捲柏

一兩

大黃白芷

一兩

當歸

一兩

木鼈子

一兩切片

松

香

一兩

白膠香

一兩

沒藥

一兩

黃丹

一兩

乳香

一兩

剪刀草末

一兩野茨蓀也

右用淨鐺下清油亂髮炭火熬令焦盡次下側柏等

熬令紫色用柳枝不住手攪以重絹濾去滓再熬油
滾下白膠香乳沒黃丹剪刀草並次第逐旋下慢火
熬滴水成珠子就地用新汲水沃去火毒先以蔥鹽
湯洗淨次用軟帛火炙攤留孔貼之

白飲膏 治一切惡瘡腫毒

白飲 白芨 白殭蚕 當歸 大黃 乳香

桃枝 柳枝 槐枝 桑枝 皂莢枝

右等分為末每用香油一觔入前藥浸三宿緩火熬

以焦黃色為度濾去滓入黃丹半觔候油欲再滾即
撥鍋於地上用槐枝頻攪勻滴水中不散為度

善應膏 治五發惡瘡毒

當歸 白芨 官桂 白欽 白芷 杏仁 木

鼈子

各一兩
剉研

黃丹

二觔

乳香

沒藥

各半
兩研

芝

麻油

五觔

右將藥剉同油煎令白芷焦黃去滓再煎油沸下丹
用柳鉶不住手攪勻滴水中成珠住火入乳沒藥再

攪勻以磁盒收每用依常攤貼一方有白礬

乳香膏

白膠香

兩一

當歸

兩一

木鼈子

枚十

薑黃

兩半

南

星

兩半

生地黃

兩一

白芷

兩一

赤芍藥

兩半

乳香

一兩

沒藥

兩一

川烏

枚一

右將清油五兩入前藥熬作三兩用柳枝攪焦為度
濾去滓次後入白膠香滴水中不散為度

松脂膏 治癰腫

松脂

半 一 觔

猪脂

一 大 觔

黄芩

黄连

黄耆

當歸

大黄

芍藥

芎藭

蠟

各 一 兩

右八味㕮咀合二脂微火煎三上三下用綿及布絞

去滓火炙傅紙上隨腫大小貼日三易之

神聖膏

治療癰一切惡瘡

當歸

半 兩

杏仁

四 十 九 枚

瀝清

一 兩

木鼈子仁

去 殼

黄丹

三 兩

乳香

四 錢 別 研

麝香

鷹糞

輕粉

已 上 三 味

不拘 多少

桃柳枝

各 四 十 九 枝 每 長 二 寸

右用小油半觔以綿裹當歸杏仁木鼈子桃枝柳枝
於砂石器內文武火熬用麝槐一枝嫩者攪藥焦者
取出不用離火下黃丹瀝青攪勻再上火少時滴水
中不散為度勿令傷火如軟硬了俱不中後入乳麝
等畢傾於水盆內凝滯用

如聖膏 治諸般惡瘡

當歸 熟地黃 玄參 大黃 香白芷 續斷

赤芍藥

官桂

各二兩

黃丹

秋夏用三觔半
春冬用三觔

蓬

木
一兩

右麻油六觔將前八味剉碎同白芷一塊入鍋內以炭火熬白芷焦黃色濾去諸藥不用候油冷下黃丹用柳枝不住手攪再上火熬色轉為度放冷自成膏矣

清涼膏 治發背候取下毒氣貼之
一方先用白散取之次用此藥

川當歸 香白芷 白芨 木鼈子 黃蘗 白

鯁
各一兩 乳香 白膠
半兩 膩粉
一兩 黃丹
五兩

右用清麻油十兩煎前六味候紫色去之入槐柳枝
各七寸再煎少頃又去之入黃丹五兩熬成入乳香
等重綿濾入罐子內用如常攤貼

一方有芍藥一兩

膏藥方 治諸瘡腫毒

一丹二油巴豆五 輕粉麝香加沒乳 琥珀

硃砂石腦油 七末將來同少許 文武火上用

心熬 柳杖攪來如狼虎 不問諸瘡並腫毒

貼上如同神鬼取

定痛沒藥散 按摩導引令血氣復行

乳香 沒藥 當歸 芎藭 地黃 細辛 菴

活

錢各一

蛤粉

兩一

黃丹

錢二半

蒲黃

錢三

右為細末每用乾摻在痛處手擦摩摻十餘徧然後

上大紅膏

大紅膏 治從高墮下落馬墮車節骨疼痛

乳香 當歸 琥珀 白芷 白芍藥 白

各二兩

芡 白欬

各一兩

黃丹

兩十

瀝清

兩十六

小油

兩四

沒藥

一兩

右將八味為末同瀝清一處放於磁碗內用文武火熬以瀝青化開次以小油徐下之看硬軟得所綿漉在水盆內放溫次下丹熬成膏若用攤於紙上貼之

白蠟大紅膏

當歸

剉

木鼈子

剉

赤芍藥

剉

天台烏藥

剉各

一兩

小油

四兩

琥珀

一兩

乳香

二兩

黃丹

羅過

十兩

瀝青

六兩

沒藥

二兩

血竭

另半兩

右將小油浸前四味七日七夜濾去滓却將乳香瀝
青鐵鍋內以慢火熬令消盡為度時時看硬軟旋入
前浸藥油加減用之候硬軟得所以綿濾在水中盆
內攪攪白色旋入黃丹再攪攪顏色勻於磁盒內存
放每用鐵鉚攤在厚紙上貼

乳香膏 治一切癰腫潰後肌肉不生

乾死鼠

一枚不壞者

大黃

兩

乳香

半兩

杏仁

半兩去皮

尖

鷄子黃

一兩

乳髮

鷄子大

蠟

一兩

鉛丹

六兩

水銀

半兩

油

一觔

右將先熬油令沸下亂髮死鼠大黃煎候鼠焦色綿布絞去滓下鉛丹蠟杏仁煎以柳鉚攪令黑色即下鷄子黃水銀乳香再攪勻滴水中成珠得所磁盒盛用故帛攤貼

膏藥方

桃柳冬青淡竹黃 枸杞松槐更及桑 當歸柴胡香白芷 二十四氣為正量 黃丹二兩油加

倍 湯火之中要相當 乳香沒藥加些子 切

莫輕性亂傳方

太乙膏 治惡瘡

方見本門內外諸疾類

麒麟乳香膏 治諸瘡腫硬痛疼及膿潰肌肉腐爛兼

治腐肉不退者

南乳香

一兩

沒藥

半兩

松脂

五兩

血竭

二錢

小油

二兩

木鼈子

三錢用仁去皮二錢

當歸

赤芍藥

天台

烏藥

各三錢

右除乳沒松脂血竭四味將後四味於油內浸五日
慢火同煎十數沸濾去滓澄清一宿入乳香等用柳
木鉚不住手攪成膏

紅藥子 治癰疽發背毒腫惡瘡

辰砂

乳香

各四錢
半研

硃砂

一錢

明雄黃

三錢

砒

霜

五錢

白礬

六錢火
飛枯研

麝香

三分

號丹

六錢

右為細末羅淨黃蠟和勻藥末隨瘡孔竅大小深淺
臨時作條子插入瘡孔中一日一換約用三五次令

其毒內淨却以膏藥貼之膏藥方開後

當歸 官桂 川烏 香白芷 草烏 玄參

大黃 乾地黃 赤芍藥 桃柳枝

各半 兩 各二十寸

黃丹 白膠香

各半 兩

蠟

二兩 半

蜜陀僧

一兩 半

右熬藥用清油十兩先將當歸桃柳枝等十味油內煎以黑為度去藥滓濾淨油慢火再煎徐徐入黃丹用長柳枝頻攪勻藥將成入白膠香次入蠟又次入蜜陀僧滴水中成珠為度出藥坐水中一日夜出火

毒用

乳香膏 治一切癰腫瘡癤

清油

一觔

皂莢

五挺去皮剉

葱白

五握剉

鉛丹

團粉

各六兩

松脂

四兩

乳香

一兩

當歸

一兩

桂心

一錢

右先將清油於銚子內慢火煎熟入皂莢葱白桂心同煎令黃赤色濾去滓後下松脂乳香沸下粉鉛丹當歸同熬成膏滴水中成珠為度收磁盒內以故帛上攤貼每日早晚換

佛手膏 治一切瘡毒癰毒

清麻油

半

鉛丹

三兩

柳白皮

二兩

皂莢刺

十四

九枚

當歸

半兩

白芨

一分

黃蠟

半兩

朱紅

一分

生紅帛

五寸燒
灰細研

右熬油令沸下柳皮皂刺煎候赤黑色以帛濾過下丹煎以柳鉚攪候變黑色即下諸藥末攪勻滴水中成珠得所以磁盒盛用故帛塗貼日二上

黃芪膏

治癰疽瘡癰傷筋腫毒止疼痛

黃芪

兩 剉半

零陵香

一分

赤芍藥

剉

芫薺

剉

天麻

剉

防風

去叉剉

生乾地黃

剉各錢

黃蠟

兩二

半

清油

半觔

右除蠟外作一處用銀石器內以油浸七日文武火

煎焦黃色綿濾去滓下蠟再煎令蠟化於磁器中每

用以軟帛薄攤貼如皮膚瘙癢筋脉緊束用少許塗

摩

垂柳膏 治一切瘡腫

垂柳枝白皮

三兩

蒴藿根

四兩

熟鷄子黃

一枚

丹砂

一分

熊膽

半兩

故絹帛

十寸燒

蠟

一兩

鉛丹

四兩

清油

一觔

右熬油沸下柳皮蒴藿根煎候赤黑色漉出以綿濾去滓下丹蠟煎以柳鉶攪候變黑色下四味研藥更攪勻滴水中成珠以磁盒盛如用故帛上攤貼日二上或患腸癰綿裹半棗許含化嚙津眼暗作鉶子鉶刺孔三十五箇貼眼上耳聾作鉶子當中刺數孔

塞耳中日二換打損塗貼患處無此用後萬應膏

黃丹

半觔

香油

一觔

巴豆

去殼七十五枚

沒藥

乳香

木鼈子

木香

各二錢末

白芷

二錢為末

右將木鼈子去殼取仁切碎共巴豆一處下鍋用文

武火煎熬黑色為度用篦籬撈去入黃丹即用柳枝

左攪三千却入乳沒木香白芷末再攪勻候得所出

火毒冷收貯遇用旋攤

神異膏 治癰疽諸腫惡瘡已成未成者

鬼面烏頭

不去皮尖

木鼈子

去殼不去油

當歸

去蘆

貝

母

南星

半夏

各一兩

白芷

白朮

各半兩

右為粗末用真香油六兩浸之愈久蘖藥赤黑色綿子濾去滓再煎油三五沸入黃丹二兩桃柳枝攪逐旋下用黑為度春夏秋宜合以瓷餅收之皮紙攤貼

留口

雄黃膏

治癰疽惡瘡生肌引膿排毒氣蝕惡肉除死

肌

雄黃

半兩 細研

巨勝油

七兩

丹砂

半兩 細研

審陀僧

各半 煅研

兩

鉛丹

三兩

蠟

一兩

雄黃

七兩 煅醋淬
偏持末

牡蠣

煅研
三分

右研和勻先熬油令沸下蠟鎔盡次下丹以柳鉚攪
候變黑色即入諸藥攪勻滴水中成珠以磁盒盛故
帛上塗貼日二易之

膏藥方 治一切毒瘡腫毒

木鼈子仁

五靈脂

巴豆肉

五粒

白芷

芫花

如無漏甘

石代亦得

黃丹

白膠香

香油

各等分

右為末先用前五味同油煎赤色濾去滓入丹膠香熬無油珠不粘手為度

黃蘗膏

治一切惡瘡腫毒

黃蘗

二兩

黃連

二兩

大黃

黃芩

穿山甲

木

鼈子

去殼各二兩

槐枝

四兩

黃丹

一兩

右為粗末用香油二觔入前藥浸三宿煖火熬以穿山甲焦黃色為度濾去滓將黃丹摻入油內候略欲

沸即掇下鍋頻攪和勻亦用槐枝攪滴水不散為度

赤芍藥 治發背諸般惡瘡癰瘡等疾

赤芍藥

錢五

草麻子

六十枚

猪脂

一斤

巴豆

六十枚

當歸

錢五

垂柳枝

七條長三寸

黃丹

四兩

香油

八兩

右以香油煎各藥文武火三上三下瀝去滓方入黃

丹用柳枝不住手攪滴水中試之不散為度冬月增

油夏用油六兩有患內癰腸癰用此為丸米飲下瀉

惡物

膏藥方 治諸般惡毒瘡

雄黃

半錢

黃丹

兩

松脂

輕粉

錢一

龍骨

錢二

乳香

半錢

降真香

錢二

巴豆

錢二

半錢

或

碎用二枚

右用香油二兩半煎熬末藥巴豆黃黑色為度再入松脂又入丹收成膏入雄黃等攤貼如瘡未破再將去殼巴豆一枚杵爛置膏中心貼患處

神異膏

治癰疽發背惡毒瘡癰其效如神

黑參

白芷

露蜂房

杏仁

木鼈子仁

男

子髮

洗焙各二錢

蛇蛻

肥白巴豆

十五枚

右剉細麻油五兩同藥入砂銚浸一宿慢火煎更換
柳枝攪候藥色焦黑頻冷爐絹濾再入銚煖入淨虢
丹二兩柳枝急攪候黑色滴入水成珠入乳香末二
錢拌和傾入磁器候凝覆泥地三日貼之

神異膏 治發背癰疽諸般惡毒瘡癤其効如神治疽
疾先以麥飯石膏塗傅候其瘡根脚漸收止於寸徑
大却用神異膏貼之收口此藥隨其人病深淺取効

合時不可與婦人雞犬猫厭穢物見之

露蜂房

淨細二兩
有新者妙

玄參

去蘆
半兩

綿黃耆

去蘆
三分

全蛇蛻

鹽水洗
焙半兩

黃丹

細羅
五兩

杏仁

去皮尖
切一兩

真

麻油

一

男子亂

洗淨
焙乾

右將麻油入銀鉚中同髮於文武炭火熬候髮焦鎔
盡以杏仁投入候變黑色用好綿濾去滓再將所熬
清油入鉚內然後入黃耆玄參二味慢火熬一二時
久取出鉚子安冷爐上半時久火力稍息旋入露蜂

房蛇蛻二味將柳枝急攪却移銚於火上不住手攪
慢火熬至紫黃色用綿濾過復入清油在銚內乘冷
投黃丹急攪片時又移銚於上以文武炭火熬不住
手柳枝攪千餘轉候藥油變黑色滴於淨水中凝結
成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所
然後磁器內封收以用或恐偶然熬火大過稍硬難
於用却少將蠟熬麻油在內以磁器盛封蓋於甌上
蒸乘熱攪調收用膏藥熬成後須連所盛磁器置淨

水中出火毒一晝夜歇三日用方可用日換兩次夜換一次熬此膏藥極難於火候須察頻看火緊慢大猛即藥中火發不特失藥性又傷人面目救助不及千萬謹戒膏藥方甚多不下數十治疽之時神効無出於此方千金不換杖瘡尤効

沒藥膏

治發背

方見本門瘡毒腫傷折類

金絲膏

治諸般瘡

木鼈子

五枚

乳香

三錢

沒藥

四錢

當歸

五錢

雄黃

錢四

白膠

兩半

黃蠟

錢三

右先用小油半觔和蠟一處看硬軟次入餘藥末攤貼

黑神膏

治諸瘡榮衛未腐腫痛堅硬焮赤不消

當歸

兩一

黃丹

兩六

柳枝

桃枝

各二兩

小油

兩二

兩

血餘

如鷄子
二塊

杏仁

湯浸去皮
尖一百箇

右除黃丹外入鍋內以火熬兩時辰綿濾去滓再入鍋內熬滴水成珠不散入黃丹用文武火熬成黑膏

用

木通膏 治一切癰疽發背疼痛不止

木通

二兩

黃丹

五兩

細辛

一兩

茵陳

一兩

琥珀

半兩

別研

硃砂

半兩

右先煎油令沸即下細辛木通茵陳煎五七沸去滓
即入琥珀硃砂末更煎用柳木鉚攪候滴水中成珠
膏成收於磁盒中每攤膏於故帛上貼日二易

丁香膏 治一切癰疽發背疼痛不可忍

丁香

半兩

麻油

一兩

黃丹

七兩

丈夫頭髮

一兩

蠟

一兩

桂心

半兩

當歸

半兩

右煉油令香下髮煎盡次下蠟以綿濾過却入鐺中

下黃丹不住手攪候色黑滴水內如珠即下桂下當

歸等末攪勻以磁器盛用故帛候攤貼日二換

五枝膏

香油

一兩

桃枝

柳枝

橘枝

梅枝

桑柱

草麻子

六十七粒去殼

右各藥浸油中同煎赤色撈去五枝用帛濾淨下乳香一錢次下沒藥三錢逐旋下黃丹半觔次下瀝青不住攪之膏成為度

萬應膏 治一切惡瘡疼痛

乳香

錢一

木鼈子

四箇去皮

當歸

半兩

黃丹

四兩

桃

枝

槐枝

各四寸

清芝蔴油

半觔

右入油內慢火熬不住手攪焦色去滓入黃丹熬滴水不散入乳香攪勻收用

止痛拔毒膏 治一切瘡發腐爛不可近未破貼則破

已破則生肉兼治杖瘡疔瘡

斑猫

四十箇

柳根

四十條

木鼈子

七箇

乳香

沒

藥

麝香

少許

松脂

三錢

右用真清油十四兩煎黑柳條焦枯瀝去滓入黃丹五兩滴入水中成珠為度却入諸藥攪及勻入磁器中收了後用神効

千金錠子

蟾酥

不拘多

粉霜

少許

雄黃

少許

麝香

少許

巴豆

一枚
去殼

八角兒

四箇柳
樹上者

乳香

少許

右將八角兒先研如泥化開黃蠟少許入前藥末和成膏子如麥粒大如有患瘡者先用迷針針破疼時用槐條兒送下藥隨後用雀兒糞瘡口內放一粒如瘡疼者非疔不須再下藥如針破無血係是着骨疔即於男女左右中指甲內刺無血即於脚上大拇指甲內刺取血糊納藥丸下瘡口効如是都無血時恐

證難醫必即死然如此可再用香油二觔黃丹一觔
白巴豆四百八十箇銅鍋內煎油熟次入桃枝二十
根煎枯將出次下柳枝二十根長二寸煎枯將出三
次下巴豆煎枯將出油放入磁鍋內煎油熟下丹文
武火攪勻一箇半時辰熬取下於地再攪滴水成珠
沉下方好就砂鍋番轉合在地上二日第四日方可
用

野葛膏 治癰疽痔瘻惡瘡婦人妬乳漆瘡

野葛 芍藥 薤白 當歸 通草

各一分

附子

分一

右咬咀醋浸半日先煎猪脂八合候令烟出内乳髮二分令消盡下之待冷又内松脂八分蠟二分更著火上和次内諸藥煎令沸三上三下去滓以故帛傅藥貼腫上乾即易如春月去附子其髮須淨洗不爾瘡疼

烏犀膏 治一切惡瘡瘰癧癰疽發背瘡陰灸瘡湯火

瘡及閃撲損

白芷 板藍根 苦參 苦薺

並剉各一兩半

鉛丹

六兩

清麻油

十五兩

右先將油同前四味慢火熬煎令藥焦黑用綿濾去滓再入鍋內亦用文武火煎沸下鉛丹以柳木鉚攪勻滴水內成珠為度即傾磁器內密封收如用無灰紙攤貼

胡粉膏 治一切癰疽發背日夜發渴疼痛不止

胡粉

四兩

油

半兩

蠟

三兩半

乳香

半兩
細研

麝香

一錢

細研

沒藥

半兩
細研

右以文火煎令油熟下胡粉後下蠟臨成下麝香乳
沒攪勻勿住手待星花上即住以磁器內盛於故帛
上塗貼日二換

無名異膏

治一切瘡毒

無名異

細研

麒麟竭

細研各
一分

柳枝

剉二
兩

蠟

一兩

鉛丹

五兩

油

十二兩

右熬油令沸下柳枝煎候赤黑色以綿濾過再煎下
丹蠟攪候變色滴水中成珠得所下騏驎竭無名異
末更攪令勻瀉冷水中捻作挺子一切惡瘡發背諸
毒瘡並宜塗貼

如聖膏 治一切惡瘡癰毒

薔薇根

剉

乳香

阿魏

研各一兩

柳枝

二兩剉長一寸

鉛丹

六兩

清油

一觔

右熬油令沸下柳枝薔薇根煎候黃黑色以綿濾過

下丹煎攪候變黑色次下乳香阿魏更攪令勻一切
瘡腫並用故帛上塗貼之如患赤眼頭痛眼溢貼太
陽兩次驢傷馬墜婦人血氣並當歸酒下三丸如梧
桐子大癬瘡先抓破取膏塗貼

白膏 治一切瘡癰癰腫及瘻瘡杖瘡等

定粉

三兩

清油

四兩煉熟
取三兩

鉛丹

二錢

商陸根

三分

暴乾

蠟

四兩

白柳枝

半兩青白而葉大者冬月
抹去粗皮取內白皮切作

片子暴

乾秤

右先以熟油熬商陸根柳枝令色變後入粉蠟丹攪之不佳手直至滴水內為珠攤帛上貼之熬時始則色微紅次微青乃熟也取出久而色白冬色愈白

乳香膏

香油

二兩

草麻

六十五粒去殼

赤芍藥

三錢

當歸

一錢半

木鼈

三箇去殼

楊枝

十束

右將藥沒油中煎去滓藥淨次下乳香二錢瀝青十二兩入內調成膏滴水中不散為度

黃蠟膏 治臘瘡

槐條 椿皮 桃條 棟條 柳條 荊芥

各一束

右各條熬湯盪洗用無漿絹帛拭乾用生黃蠟於紙上量瘡大小攤膏十箇十層栓於瘡上三日一次洗除去着瘡蠟紙膏一箇不用貼之一月無問年深近日必愈

金絲膏 治諸般惡瘡疼痛

白膠香

錢五

瀝青

黃蠟

錢三

小油

錢三

沒藥

錢二

另研

乳香

二錢半
另研

右將油蠟白膠瀝青用柳枝攪化盡後用乳沒入藥
內再攪勻綿濾過傾水內再攪三二十徧後任意攤
用

調聖膏 治二十四腫瘡毒等證

新石炭

蕎麥桿灰

半錢

胡椒

三十粒

巴豆

三十粒去

殼

木鼈子

去殼

落藜草灰

半升

右以三灰一處和勻三藥一處研細別置箱箕攤帛

於箕內置灰帛上下置丸鉢盛貯用沸湯五盞淋取汁候稍澄勿用脚將汁入鉢熬沸纔乾又添直待煎至半盞許如兩呷多太乾即剗起入磁器內以椒巴豆等藥末攪令勻使用黃蠟封固勿泄氣候冷挑一星許微點舌頭上即時潰爛些少過一刻使無事此其驗也

膩粉膏 治風邪熱毒等證容搏皮膚之間以致身體生瘡或癢或痛及大小頑疥瘡癩赤疼痛黃水浸淫

侵展肌汁不絕

甘草

一兩末

猪脂

煉六兩

松脂

半兩

膩粉

胡粉

黃連

末各二兩

右藥先以猪脂煎松脂次入黃蠟二兩濾去滓次下膩粉并四味攪勻仍於磁器中收貯每用少許塗之日三四易此膏援熱毒止痛生肌肉歛瘡口

乳香金縷膏 治一切瘡腫

玄參

二兩

黃芩

柳枝

槐枝

當歸

各二兩

黃

芪一兩

右用香油一觔慢火熬藥至黑色濾去滓入黃丹四兩飛過熬至黑色滴水中不散為度放冷用紙攤貼香油半觔料總計四兩夏用丹三兩冬用二兩半春秋二兩八錢

碧油膏 止痛排膿未潰用之則消腫散毒已潰破則排膿生肌及治灸瘡後便用此膏貼則尤佳

桃枝 柳枝 桑枝 槐枝 白莢枝

右焙乾為末麻油十兩同煎取八兩去滓令淨入黃
丹乳香血竭末各半兩再熬成膏熬約七兩以下用
磁器盛埋地中一宿去火毒以無灰紙攤貼

善應膏 治癰疽潰後長肌傳癰

白芷

黃芪

各一兩

甘草

一錢

黃蠟

二兩

黃丹

二兩

半

右前三味並為粗末春秋用真麻油四兩半夏四兩
冬月用五兩熬藥紫色用綿去滓然後入臘黃丹

以柳枝不佳手攪勻滴水成珠即止用如常法

紫金膏 治一切瘡腫

皂莢

一錢不蛀者去皮

葱

五莖去根

鉛丹

研

團粉

研各四兩

松脂

研二兩

右清油半觔先煎皂莢葱二味焦黃綿濾去滓次下鉛丹又下團粉松脂以柳木鉚不佳手攪滴水中不散為度隨瘡大小攤貼之

寒水石膏 治發背

寒水石

二兩為末謂之石膏明者擇明月盈夜埋地中露天三日夜薄土蓋挹其月華取出

不見火研

清麻油

四兩

黃蠟

黃丹

各一兩

楓香

二兩

右將油熬黃蠟等三味成稀膏提起藥銚候無烟下寒水石末急調勻又露月下三夜日間收起若陽證變發背瘡用之立効不問破與不貼之如冰

生肌長肉膏

治一切癰疽惡瘡

清油

十兩

龍骨

研二兩

木香

檳榔

黃連

去須各三

分同三味為細末

右將油入鍋內慢火熬滴水成珠下龍骨末更熬如
稀膏則止去火候稍溫入三味藥不得住手攪候冷
以磁盒盛收隨瘡大小攤貼

玄武膏 治癰疽發背疔腫內外腫瘡陰陽諸惡瘡及
頭頂癰腫不問已潰未潰皆可用大能排膿散毒止
疼生肌累有神驗若疔腫先用銀篦或皂角針於疔
瘡中間及四畔針破令出惡血以追毒餘如小麥大
擦入孔中却以此膏貼之如瘡壞爛至甚難以藥貼

則將皂角二三片煎油調勻此膏如稠糊傳之膿水
或轉多數次傳之乾愈妙

巴豆

二兩
淨

木鼈子仁

二兩

黃丹

四兩

清油

十兩

槐柳嫩枝

各七條每長
寸許剉碎

右將木鼈子巴豆槐柳枝用磁器或銅鐵銚盛油浸
藥一宿慢火煎熬諸藥黑色用生絹帛濾去滓復將
所濾油於慢火上再熬却將黃丹入油內用長條槐
柳枝不住手攪候有微烟起即將出藥點滴在水面

上凝結成珠不散成膏矣傾入磁器內收貯置新汲水內三日出火毒後攤用

烏膏 療一切瘡引膿生肌殺虫

烏麻油

一升用清者

黃丹

三兩羅

松脂

半兩末

薰陸

香

一兩乳頭者

蠟

半兩煉淨

右先空煎油三分減一停待冷次入黃丹更上火緩煎又三分減一又停冷次入薰陸香末不冷即恐溢沸出煎候香消盡下松脂及蠟看膏稍稠即點鉄物

上試之斟酌硬軟適中乃罷先問所患瘡是熱即減
薰陸香及松脂若瘡苦疼如久不差此涉於冷依方
煎之治杖瘡者油若一升地黃汁半合黃丹二大兩
蠟一小兩餘準上法

乳香膏 治諸瘡癰癰等及小兒瘡

乳香

一兩

膩粉

松脂

蜜陀僧

各半兩

生地黃

汁

半合

右為末用好油四兩黃蠟二兩煉熟下諸藥熬成膏

入麝香一錢取出窰一宿每用看瘡大小攤貼日一
二換

神仙膏

治馬汗血入瘡

一名膏藥方

鉛丹

三兩炒紫色

清麻油

六兩

當歸

半兩切碎綿裹

杏仁

四十九枚不去皮尖椎碎綿裹

桃柳枝

各二十一莖但長肥瘦者佳

右先油慢火煎約三時辰入杏仁當歸兩裏候杏仁
黃紫色漉出二味却入桃柳枝煎亦如杏仁等時候
漉別用綿濾過再煎下鉛丹用柳木鉚攪一向左轉

不佳手至稠取膏少許滴水中若直墜下水底不散
在水面其膏成矣傾在瓷器中候冷却以新汲水浸
一宿來晨去水收貯勿令雞犬婦見每用少許攤貼
乳香膏 治發背癰疽腫痛一切瘡癰

黃蠟

一兩半

定粉

二兩半

乳香

一兩

小油

四兩

右用瓷碗盛油蠟放湯鍋熬消盡蠟入乳香定粉用
柳枝攪沫散放冷水內去火毒量瘡攤帛紙隨用忌
鉄器

白玉膏 治縮收癰疽不令蔓衍切忌用冷藥

杏仁

二十一粒去
皮尖別研

川椒

四十九粒去
目出汗為末

清油

一

右同熬至紫色黑新綿濾過用無灰薄紙看瘡大小
剪作梳樣攤藥在上於瘡暈盡處兩邊圍遠貼之候
暈漸收近裏別剪差小者再攤藥圍貼暈又收即又
再移近裏貼仍頻換候暈已收見瘡根脚或瘡口即
用次方凡貼大惡瘡毒氣方盛不可以藥當上貼恐
過散毒氣瘡益大此藥能收暈見瘡根其法大妙



普濟方卷三百十三